



HAL
open science

L'aubergine, de l'état sauvage ancestral à aujourd'hui

Marie-Christine Daunay

► **To cite this version:**

Marie-Christine Daunay. L'aubergine, de l'état sauvage ancestral à aujourd'hui. Jardins de France, 2015, 635, pp.39-41. hal-02637174

HAL Id: hal-02637174

<https://hal.inrae.fr/hal-02637174>

Submitted on 27 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



PHOTO 4 : LES FRUITS
D'AUBERGINE REPRÉSENTENT
UNE GRANDE DIVERSITÉ
MORPHOLOGIQUE.
© INRA

Histoire de plantes

L'AUBERGINE, DE L'ÉTAT SAUVAGE ANCESTRAL À AUJOURD'HUI

Par Marie-Christine Daunay

L'aubergine (*Solanum melongena* L.) est une espèce légumière associée dans notre inconscient collectif à l'été et au régime alimentaire méditerranéen. Pourtant, on la trouve toute l'année sur les étals car sa production s'est désaisonnalisée en Europe depuis une trentaine d'années, avec le développement des cultures sous abris en contre saison, et l'importation en provenance en particulier d'Espagne. Plante de lumière et de chaleur par nature, elle est appréciée des cuisiniers pour ses qualités texturales, de rétention des saveurs dans les plats cuisinés et son goût propre, parfois légèrement amer.

Comme toutes les plantes alimentaires, l'aubergine est d'origine sauvage. L'histoire de la domestication des plantes, puis de leur évolution jusqu'aux formes cultivées

d'aujourd'hui, peut être reconstituée à partir de fragments d'information, dispersés à la fois sur le terrain dans leurs centres d'origine et de diversification, dans divers documents élaborés par l'homme au cours des âges, jusqu'aux publications scientifiques modernes. Depuis toujours, l'Homme utilise les plantes (comme les produits animaux et les minéraux) pour se soigner et se nourrir. Elles sont également associées à ses croyances, rituels et expressions artistiques. Leur histoire est donc intimement mêlée à celle des hommes qu'elles ont suivis dans leur conquête du monde. Sous l'œuvre combinée des spécificités culturelles et des conditions agro-climatiques des pays où elles ont essaimé au cours des siècles, les formes cultivées se sont extraordinairement diversifiées à l'échelle mondiale. À notre époque, l'œuvre de modelage des plantes pour répondre aux besoins des acteurs des filières (agriculteurs, industriels, distributeurs, consommateurs) est en majorité dans les mains de sélectionneurs et généticiens professionnels.



PHOTO 1: FRUITS D'AUBERGINE SAUVAGE (< 3 CM DE DIAMÈTRE) - © INRA

— UNE BELLE ASIATIQUE DOMESTIQUÉE —

Ce qu'offrent les étals d'aubergine en France est une infime représentation de la diversité existante, que l'on peut découvrir en voyageant, en particulier en Asie et dans le bassin méditerranéen, ou en consultant les catalogues de certains distributeurs commerciaux. Il existe des collections variétales *ex situ*, conservées dans certaines banques de gènes ou instituts de recherche (comme à l'INRA, où près de mille entrées sont conservées), mais elles sont utilisées principalement par les chercheurs et les sélectionneurs.

L'aubergine, que l'on croit méditerranéenne, est en fait une belle asiatique, qui fut domestiquée dans les siècles précédant l'ère chrétienne, dans la zone qui s'étend de l'Inde au sud-ouest de la Chine, à partir de plantes sauvages épineuses à très petits fruits ronds ou légèrement oblongs, verts et amers (photo 1). Pourquoi et comment elle fut domestiquée, demeure énigmatique. Sans doute les populations locales y trouvaient-elles un agrément organoleptique dans des temps où le piment américain était encore inconnu. On trouve un indice de cet intérêt dans certaines préparations culinaires d'aujourd'hui, comme par exemple un curry vert thaïlandais où un type particulier d'aubergines locales, pas plus grosses qu'une balle de ping-pong et coupées en quartiers, se mêlent dans un lait de coco délicieusement parfumé, aux très petites baies rondes de *Solanum torvum* (photo 2), libérant sous la dent surprise un mélange de textures et de saveurs très dépaysant pour un palais français.

— DES FORMES SPONTANÉES —

On trouve encore aujourd'hui des formes spontanées d'aubergine, principalement à proximité ou dans les villages en Asie du sud-est, notamment en Inde, Birmanie et



PHOTO 2: FRUITS DE *SOLANUM TORVUM* SUR UN MARCHÉ EN THAÏLANDE (DIAMÈTRE ~ 1 CM) - © INRA

Thaïlande, dont les fruits ronds ou légèrement allongés, présentent une réticulation mêlant plusieurs tonalités de vert (photo 3) et ne pèsent que quelques grammes ou dizaines de grammes. Leurs tiges, feuilles et calices sont pourvus d'une densité d'épines très variable. Le statut de ces plantes est difficile à définir pour plusieurs raisons. D'une part leur diversité morphologique laisse deviner l'existence de pollinisations croisées avec les variétés cultivées, ce qui est confirmé par les analyses biochimiques. D'autre part, les types spontanés un peu éloignés des villages ne sont pas vraiment sauvages car les hommes sont toujours passés un jour ou l'autre là où on les trouve. Enfin, il existe des variétés modernes dans ces typologies « primitives », parfois même des hybrides F1 (il faut donc manier avec précaution le concept de « primitif »). En Thaïlande, les formes spontanées ont un statut particulièrement complexe car elles poussent un peu n'importe où dans les villages ou à proximité et les habitants en détruisent certaines tout en prenant soin des autres. Ils appellent « sauvages » les plantes dont les fruits ne croquent pas sous la dent et sont



PHOTO 3: COULEUR VERTE RÉTICULÉE D'UN FRUIT D'AUBERGINE SPONTANÉE, EN THAÏLANDE - © INRA



PHOTO 5: COULEUR VERTE À RÉPARTITION UNIFORME - © INRA

PHOTO 6: LE FRUIT D'UN CULTIVAR D'AUBERGINE (À GAUCHE) PRÉSENTE UNE PLUS GRANDE PROPORTION DE CHAIR QUE LE FRUIT D'UNE AUBERGINE SAUVAGE (À DROITE). LE FRUIT SAUVAGE CONTIENT SURTOUT DES GRAINES. LES DIAMÈTRES DES DEUX FRUITS NE SONT PAS PROPORTIONNELS SUR CES PHOTOS, LE DIAMÈTRE DU FRUIT SAUVAGE ÉTANT TRÈS INFÉRIEUR AU DIAMÈTRE DU CULTIVAR. - © INRA



amers. Comme on trouve en proportion équivalente celles à fruits croquants et moins amers, on peut penser que les goûts pour ces deux types coexistent depuis longtemps.

— MUTATION ET SÉLECTION —

Comment l'Homme a-t-il pu créer la diversité que l'on connaît aujourd'hui dans les tailles, formes et couleurs des fruits d'aubergine (photo 4), à partir de ces petits fruits verts? Les mutations naturelles, bien que rares, produisent des variations d'expression des caractères, qui peuvent être visibles. Par exemple, une mutation du gène codant pour l'expression des chlorophylles dans l'épiderme du fruit abouti à l'apparition de fruits blancs. La forme (= allèle) sauvage du gène donne des fruits verts, la forme mutée donne des fruits blancs. Le caractère « répartition des chlorophylles dans l'épiderme du fruit » présente deux formes : la forme sauvage avec la répartition réticulée, et la forme mutée avec la répartition uniforme (photo 5). Les mutations peuvent aussi porter sur de petites variations d'expression des caractères, et lorsque la pression de sélection sur de telles petites différences s'exerce au fil de nombreuses générations, au final la modification du caractère sauvage peut être importante. De plus, les mutations se couplent aux recombinaisons génétiques au gré des hybridations spontanées entre plantes. La nouvelle variabilité naturelle ainsi créée a été exploitée au fil des ans et des siècles par les paysans, via leur choix des porte-graines à l'origine de chaque génération.

C'est donc par l'action combinée de ces trois grandes forces, les mutations, les recombinaisons et la sélection que se sont développées (1) les variétés avec des fruits antho-

cyanés (pigments couvrant la gamme bleu, violet, rouge) présentant une grande diversité de nuances et intensités, (2) les fruits allongés, et (3) que la taille des fruits a été considérablement augmentée (les plus gros fruits d'aubergine peuvent peser plus d'un kg), par l'hypertrophie de la chair au détriment de la proportion de graines (photo 6). La diversité des aubergines d'aujourd'hui est donc le résultat de l'exploitation des variations naturelles par les paysans. C'est en Inde et en Chine que l'on trouve la plus grande diversité variétale, le bassin méditerranéen étant le troisième bassin de diversification de l'aubergine mais en mode mineur par rapport aux deux géants asiatiques.

— ENTRE LES MAINS DES SÉLECTIONNEURS —

L'évolution de l'aubergine se poursuit de nos jours, pour l'essentiel dans les mains de sélectionneurs professionnels qui, comme les paysans, exploitent la diversité naturelle, mais avec des moyens d'une efficacité incomparable. Ils travaillent selon une échelle de temps accélérée (deux générations par an), contrôlent la reproduction des géniteurs à l'origine de chaque génération, exercent des pressions de sélection intenses sur des caractères très précis, identifient les gènes contrôlant les caractères d'intérêt et utilisent des méthodes de sélection adaptées aux recombinaisons génétiques escomptées. Les biotechnologies se sont ajoutées depuis une trentaine d'années à la panoplie des outils à disposition du sélectionneur moderne, en particulier les cultures *in vitro* et la biologie moléculaire. Ainsi le modelage de l'aubergine (comme des autres plantes cultivées) par l'Homme se poursuit-il sans relâche.