



HAL
open science

Identification de genes de restauration de fertilité sur cytoplasmes stérilisants chez le tournesol

Pascal Leclercq

► **To cite this version:**

Pascal Leclercq. Identification de genes de restauration de fertilité sur cytoplasmes stérilisants chez le tournesol. *Agronomie*, 1984, 4 (6), pp.573-576. hal-02728380

HAL Id: hal-02728380

<https://hal.inrae.fr/hal-02728380v1>

Submitted on 2 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Identification de gènes de restauration de fertilité sur cytoplasmes stérilisants chez le tournesol.

Patrice LECLERCQ

avec la collaboration technique de J. P. PHILIPPON (Promosol)

I.N.R.A., Station d'Amélioration des Plantes, F 63039 Clermont-Ferrand Cedex

RÉSUMÉ

Il semble qu'on ait, pour la restauration de la stérilité mâle française chez le tournesol, un système de 2 gènes dominants complémentaires. La plupart des restaureurs de fertilité, peut-être même tous, sont porteurs des gènes (Rf1 + Rf2). La plupart des mâle-stériles classiques sont porteurs d'1 gène (Rf2).

La stérilité mâle Kouban semble restaurée selon les mêmes règles, mais nous supposons que les 2 dominants complémentaires, Rk1 et Rk2 sont différents des gènes de restauration français, Rf1 et Rf2.

Mots clés additionnels : *Helianthus petiolaris*, *Helianthus lenticularis*, stérilité mâle.

SUMMARY

Identification of fertility restorer genes for two sterile cytoplasms in sunflower.

Analysis has shown that there are 2 complementary dominant genes for restoration of French cytoplasmic male sterility in sunflower. Most, perhaps all, fertility restorers carry the 2 genes, Rf1 + Rf2. Most male-sterile forms carry 1 gene, Rf2.

Cytoplasmic male sterility from Kouban (*H. lenticularis*) was restored by a similar system, but we suppose that the 2 dominant complementary genes (Rk1 + Rk2) are different from the restorer genes for French cytoplasm (Rf1 + Rf2).

Additional key words : *Helianthus petiolaris*, *Helianthus lenticularis*, male sterility.

I. INTRODUCTION

Si on reconnaît l'existence d'une stérilité mâle cytoplasmique à partir du moment où on a observé 2 descendance successives entièrement mâle-stériles dans une même filiation maternelle et si on distingue un cytoplasme stérilisant (c'est-à-dire une source de stérilité mâle) des autres cytoplasmes par l'éventail des restaureurs et mainteneurs, alors on connaît actuellement 2 cytoplasmes stérilisants chez le tournesol : le français (I.N.R.A.) et le soviétique (Kouban), (LECLERCQ, 1983).

La distinction des cytoplasmes par le seul éventail des restaureurs peut prêter à critique. Ainsi, dans le cas du cytoplasme français (I.N.R.A.), on a mis en évidence 2 gènes complémentaires de restauration : Rf₁ et Rf₂. Si l'on dispose d'une lignée F Rf₁ Rf₁ rf₂ rf₂, elle apparaîtra restauratrice en présence d'un mâle-stérile S rf₁ rf₁ Rf₂ Rf₂ et mainteneuse en présence d'un mâle-stérile S rf₁ rf₁ rf₂ rf₂. Dans un tel cas, il pourra paraître tentant de proclamer l'existence d'un nouveau type de cytoplasme, puisque le 2^e mâle-

stérile n'a pas exactement les mêmes restaureurs que le 1^{er}. Mais cette conclusion serait fausse.

Pour éviter de telles confusions, il est important d'identifier, au moins sur quelques lignées, les gènes de restauration mis en jeu. C'est le but de la présente étude.

II. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE COMMENTÉE

La stérilité mâle cytoplasmique française (I.N.R.A.) a fait l'objet d'une publication en 1969 (LECLERCQ, 1969). En R₁ (F1 × parent mâle tournesol), en même temps que nous découvrons les premières plantes mâle-stériles, leurs sœurs mâle-fertiles étaient vraisemblablement porteuses des gènes de restauration. En effet, la fécondation d'*Helianthus petiolaris* (S Rf Rf) par le tournesol (F rf rf) nous a donné une F1 mâle-fertile (S Rf rf). Cette F1, fécondée par du tournesol (F rf rf) a produit logiquement, à la fois des plantes mâle-stériles (S rf rf) et mâle-fertiles (S Rf rf). Une opinion a été émise par certains com-

mentateurs (VRANCEANU & STOENESCU, 1971) selon laquelle la stérilité mâle cytoplasmique a été découverte en France et les premiers gènes de restauration de fertilité ont été reconnus à l'étranger (Etats-Unis, Roumanie). Cette opinion ne résiste pas à l'examen : en effet, par la logique interne du système, en R1 nous avons mis en évidence en même temps la stérilité mâle cytoplasmique et les gènes de restauration de fertilité, que nous avons appelés Msc_1 , qui provenaient du croisement réalisé à Clermont-Ferrand, évoqué ci-dessus, entre *H. petiolaris* et *H. annuus* (tournesol). L'existence de gènes de restauration de fertilité chez *H. petiolaris* découle logiquement de l'interprétation théorique ci-dessus ($H. petiolaris = S Rf Rf$) mais, de plus, nous l'avons prouvée directement en fécondant un mâle-stérile par *H. petiolaris*. Nous avons alors établi que *H. petiolaris* ne différait des mâle-stériles utilisés que par un gène dominant de restauration de fertilité (LECLERCQ, 1979).

ENNS *et al.* (1970) signalent l'existence d'un gène dominant de restauration de fertilité à partir de plusieurs sources américaines dont l'une vient de *H. petiolaris*.

KINMAN (1970) reconnaît l'existence d'un gène dominant de restauration de fertilité qu'il appelle Rf_1 .

VRANCEANU & STOENESCU (1971) signalent la rareté des gènes de restauration chez le tournesol mais trouvent cependant, dans une seule lignée, un gène de restauration qu'ils dénomment, provisoirement, Rf_2 , pour le distinguer du Rf_1 de KINMAN, sans que la différence entre Rf_1 et Rf_2 ait été mise en évidence.

A ce stade des connaissances, on peut abandonner la désignation Msc_1 (LECLERCQ, 1971) et rejoindre la dénomination de KINMAN : Rf_1 . Les gènes dominants découverts par LECLERCQ, ENNS et VRANCEANU, pourraient être appelés provisoirement et respectivement : Rf_L , Rf_E , Rf_V ; l'affectation d'un n° (Rf_2 par exemple) ne devrait se faire que si on a prouvé que Rf_1 et Rf_2 sont différents.

Par la suite (FICK & ZIMMER, 1974), a été mise en avant l'hypothèse de 2 gènes dominants complémentaires, Rf_1 et Rf_2 , expliquant en F2 une ségrégation de 9 mâle-fertiles pour 7 mâle-stériles. La plupart des mâle-stériles possédaient le gène Rf_2 seulement et la plupart des restaureurs, les 2 gènes Rf_1 et Rf_2 : dans ce cas, on observe en F2 la disjonction pour un seul gène (3 : 1). Cependant, en croisant le mâle-stérile Ha 267 par le restauteur Rha 280, on trouve 9 : 7 en F2. Les auteurs mettent en avant 2 hypothèses exclusives l'une de l'autre :

— Rha 280 a Rf_1 seulement et Ha 267, Rf_2 seulement,

— Rha 280 a Rf_1 et Rf_2 et Ha 267 n'a aucun gène dominant de restauration.

Ils ne choisissent pas entre ces 2 hypothèses.

GIMENEZ & FICK (1975) mettent en avant l'hypothèse de 4 gènes pour expliquer restauration et fertilité. La restauration serait assurée si au moins 2 gènes dominants sont présents ensemble. Mais les résultats chiffrés à l'appui de cette hypothèse sont peu nombreux.

L'un des gènes de restauration serait présent dans Ha 89.

En Inde, REDDY & THAMMI RAJU (1977) mettent en évidence, en F2 et F3, l'existence de 2 gènes domi-

nants complémentaires (9 : 7 en F2) à partir d'un matériel venu de France. Les auteurs écrivent : « la lignée mâle stérile était évidemment un double récessif et le mâle un double homozygote dominant ». Mais cette conclusion n'est pas évidente du tout, car l'attribution à chacun des 2 parents d'un seul gène dominant (par exemple Rf_1 pour le mâle, Rf_2 pour la femelle) donnerait en F1 et F2 exactement les mêmes résultats.

En 1978, VRANCEANU & STOENESCU confirment l'existence, selon les croisements mis en jeu, d'un gène dominant de restauration, ou de 2 ou de 3 gènes dominants complémentaires.

En 1979, LECLERCQ confirme l'hypothèse de 2 gènes dominants complémentaires : à partir de 2 F1 ayant un parent mâle commun, Bza1, on obtient 2 F2 dont l'une donne 1 stérile pour 3 fertiles ($CIC\ 61 \times Bza1$), l'autre 7 stériles pour 9 fertiles ($CA\ 4 \times Bza1$). Comme Bza1 a au moins 1 gène de restauration de fertilité (soit Rf_1 , pour suivre la terminologie de KINMAN), on doit admettre qu'il en a 2, Rf_1 et Rf_2 . En effet, si Bza1 n'avait qu'un seul gène dominant de restauration (Rf_1), aucune formule ne conviendrait pour $CIC\ 61$ mâle-stérile :

— $S\ rf_1\ rf_1\ rf_2\ rf_2$ et $S\ Rf_1\ Rf_1\ rf_2\ rf_2$ ne donneraient pas de mâle-fertiles en F1,

— $S\ rf_1\ rf_1\ Rf_2\ Rf_2$ donnerait 7 : 9 en F2,

— $S\ Rf_1\ Rf_1\ Rf_2\ Rf_2$ ne serait pas mâle-stérile.

Ainsi Bza1 est de génotype $Rf_1\ Rf_1\ Rf_2\ Rf_2$.

Comme $CA\ 4 \times Bza1$ donne en F2 une ségrégation 7 : 9, correspondant à la disjonction de 2 dominants complémentaires, on doit admettre pour $CA\ 4$ la formule $S\ rf_1\ rf_1\ rf_2\ rf_2$, c'est-à-dire 0 gène dominant de restauration.

D'une façon générale, chaque fois qu'on observe une F1 mâle-fertile et une F2 ayant 1 mâle-stérile pour 3 mâle-fertiles, on est amené à l'hypothèse de 2 dominants chez le parent mâle ($Rf_1 + Rf_2$) et d'1 dominant chez le parent femelle (Rf_2 en règle générale), à partir du raisonnement tenu pour $CIC\ 61 \times Bza1$.

III. RÉSULTATS NOUVEAUX

Nous avons voulu vérifier, en 1981, la ségrégation 7 : 9 pour la F2 de « Relax » ($CA\ 4 \times Bza\ 1$).

Alors qu'en 1979 on avait 21 mâle-stériles pour 31 mâle-fertiles, on observe, en 1981, 104 mâle-stériles pour 115 mâle-fertiles ; comme il n'y a pas de différence statistique entre les 2 années ($\chi^2 = 0,59$), on peut les additionner, ce qui donne 125 ms et 146 mf, en accord avec la théorie 7 : 9 ($\chi^2 = 0,53$). Mais la plupart des F2 montrent 1 ms pour 3 mf, suivant le tableau 1, ce qui conduit à attribuer 2 gènes dominants (Rf_1 et Rf_2) au parent mâle, un seul (Rf_2) au parent femelle.

Seule la F2 de $CC\ 40 \times PAC\ 1$ échappe à la règle 1 : 3. Dans ce cas, comme $CC\ 40$ peut se voir attribuer la formule $S\ rf_1\ rf_1\ Rf_2\ Rf_2$ (d'après $CC\ 40 \times PAC\ 2$, observé en F2 avec 1 : 3), on est conduit à donner à $PAC\ 1$ la formule $Rf_1\ Rf_1\ rf_2\ rf_2$. Comme on avait conclu que $CA\ 4$ avait 0 gène dominant, l'hybride $CA\ 4 \times PAC\ 1$ devait être mâle-stérile : or, ce n'est pas le cas, puisqu'il montre 3 ms + 44 mf, en 1982, 0 ms + 12 mf, en 1983. Il subsiste ici un mystère.

TABLEAU 1

Observations de la stérilité mâle dans des descendance F2 d'hybrides fabriqués avec des lignées mâle-stériles sur le cytoplasme S (français).

Male sterility in F2 progenies of hybrids made with male sterile lines with S cytoplasm (French).

Nom de l'hybride	ms	mf	χ^2 pour	
			1 : 3	7 : 9
Marianne (CVH 11 × Bza 2)	48	122	0,78	16,00
Primasol (CANP 3 × Rha 266)	56	154	0,23	24,21
Mirasol (Ha 89 × Rha 274)	66	152	2,96	15,54
62 × ZN 41	59	149	1,08	19,38
CC 40 × PAC 1	83	108	33,72	0,00
CC 40 × PAC 2	61	144	2,22	15,75
68 × ZN 41	51	163	0,09	33,69
Ha 89 × PA 23	53	125	1,92	13,56
129 × Rha 271	46	139	0,00	26,05
CS 511 × Rha 274	39	157	2,45	44,35
GL × Rha 266	48	207	4,86	63,37
Ha 89 × PR 4	63	204	0,21	43,25

La F2 de « Clairsol » est particulièrement troublante : les observations sont les suivantes :

Année	ms	mf	χ^2 pour	
			1 : 3	7 : 9
1979	24	43	3,63	1,40
1981	67	144	4,78	11,85
79 + 81	91	187	8,46	13,26
1982	58	108	8,22	4,88
79 + 81 + 82	149	295	16,89	18,33

L'addition de 1979 + 1981 est légitime, puisque les 2 années ne diffèrent pas ($\chi^2 = 0,22$) de même l'addition, à ces 2 premières années, de 1982, est également légitime ($\chi^2 = 0,14$).

En 1979, on pouvait hésiter entre les 2 hypothèses 1 : 3 et 7 : 9, par manque d'effectifs. Mais on s'aperçoit, les années suivantes, que l'augmentation des effectifs amène à rejeter l'une et l'autre des hypothèses : la proportion de ms en F2 est comprise entre 1/4 et 7/16 : elle se situe à 0,33 ce qui ne correspond à aucune hypothèse génétique simple.

IV. ÉTUDE DE LA GÉNÉTIQUE DE LA RESTAURATION DE FERTILITÉ SUR CYTOPLASME Kouban (LECLERCQ, 1983)

On pourrait désigner par S et SK les cytoplasmes stérilisants français et Kouban.

KOUKOSH (1981) indique qu'elle a mis en évidence 19 lignées restauratrices sur cytoplasme français et 21 sur cytoplasme Kouban. Les restaurations seraient conditionnées par l'interaction de plusieurs gènes.

Le tableau 2 est constitué à partir de nos observations de 1982.

Comme pour le cytoplasme français (I.N.R.A.), il semble que la restauration s'explique le plus souvent par 1 gène dominant, parfois par 2 gènes dominants complémentaires (Bza 1, PR 4, ZN 41) qu'on peut appeler Rk1 et Rk2.

Un cas demeure mystérieux : celui de PAC 21, qui ne correspond ni à 1 : 3 ni à 7 : 9 en F2.

On pourrait étudier l'hypothèse suivante : le cytoplasme Kouban ne serait pas réellement un nouveau

TABLEAU 2

Observations de la stérilité mâle dans des descendance F1 et F2 de croisements entre plantes mâle-stériles sur le cytoplasme SK (Kouban) et des lignées.

Male sterility in F1 and F2 progenies of crosses between male-sterile plants with SK cytoplasm (Kouban) and some inbred lines.

Nom du parent ♂	F1		F2		χ^2 pour	
	ms	mf	ms	mf	1 : 3	7 : 9
CCM 64	0	44	10	49	1,63	16,10
Ha 89	0	42	50	151	0,00	28,33
Bc 42	0	44	20	49	0,39	5,52
Bza 1	1	18	59	74	25,56	0,00
Bza 2	0	21	24	47	2,48	2,46
PAC	0	21	26	82	0,01	16,20
PAC 21	1	29	11	85	8,68	39,37
PAC 1	0	24	22	85	0,90	22,40
PR 4	0	38	59	106	9,62	3,96
ZN 41	8	13	35	38	19,29	0,36
Rha 297	29	0				

cytoplasme mais le même cytoplasme que le français, escorté de Rf1 seul, au lieu de Rf2 seul, comme c'est le cas le plus souvent avec le cytoplasme français.

Mais, dans cette hypothèse, la restauration de fertilité par le mainteneur HA 89 (S Rf1 Rf1 rf2 rf2 × rf1 rf1 Rf2 Rf2) devrait donner 7 : 9 en F2, alors qu'on observe 1 : 3. De plus, on ne devrait pas, alors, observer la ségrégation 7 : 9 après fécondation par Bza 1, PR 4, ZN 41 ; en effet, nous avons attribué à ces 3 restaureurs classiques la présence de 2 dominants (Rf1 + Rf2) et les F2 issues de ces 3 restaureurs devraient donner 1 : 3 si le parent femelle portait le dominant Rf1. Ainsi Rf correspondrait à la restauration de fertilité sur cytoplasme français, Rk sur cytoplasme Kouban. Il n'est pas exclu qu'au moins 1 gène Rk s'inscrive dans la série Rf.

V. CONCLUSION

Le cytoplasme français, issu de *H. petiolaris*, paraît distinct du cytoplasme Kouban, mis en évidence en URSS par ANASHENKO *et al.* (1974) à partir de *H. lenticularis* (forme sauvage de *H. annuus*, selon certains). L'hypothèse de 2 gènes dominants complémentaires, si elle explique un bon nombre de disjonctions en F2, ne donne pas réponse à tout. Il subsiste quelques mystères. L'une de nos hypothèses actuelles est que nous n'avons pas mis en évidence, à ce stade, un mainteneur à 0 dominant F rf1 rf1 rf2 rf2 mais seulement des mainteneurs à 1 dominant : F rf1 rf1 Rf2 Rf2 et que la plupart des restaureurs ont 2 dominants Rf1 Rf1 Rf2 Rf2, sauf PAC 1 qui aurait un seul dominant et serait donc de type F Rf1 Rf1 rf2 rf2. Pour chercher des mâle-stériles à 0 dominant, nous envisageons d'en féconder un bon nombre par PAC 1, et la F1 obtenue serait alors mâle-stérile. Pour l'étude de la stérilité mâle kouban, nous progresserons dans l'identification des gènes de restauration à partir du moment où nous aurons au moins une lignée mâle stérile homozygote, avec son mainteneur isogénique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Reçu le 9 juin 1983.
Accepté le 2 mars 1984.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Anashenko A. V., Mileeva T. V., Rozhkova V. T.**, 1974. Trudy Po Prikladnoj Botanike, Genetike i selektsii., **53** (3), 242-254.
- Enns H., Dorrell D. G., Hoes J. A., Chubb W. O.**, 1970. Sunflower research, a progress report. *Proc. 4th Int. Sunflower Conf.*, Memphis, Tennessee, USA, 162-167.
- Fick G. N., Zimmer D. E.**, 1974. Fertility restoration in confectionery sunflowers. *Crop Sci.*, **14**, 603-604.
- Gimenez J. D., Fick G. N.**, 1975. Fertility restoration of male sterile cytoplasm in wild sunflowers. *Crop Sci.*, **15**, 724-726.
- Kinman M. L.**, 1970. New developments in the USDA and State Experiment Station sunflower breeding programs. *Proc. 4th Int. Sunflower Conf.*, Memphis, Tennessee, USA, 181-183.
- Koukosh Marie V.**, 1981. Some aspects of a study of fertility restorers in sunflower (*Helianthus annuus* L.) (en russe). *Byull. Vses. Int. Rastenievodstva Imeni N.I. Vavilova*, **115**, 44-49.
- Leclercq P.**, 1969. Une stérilité mâle cytoplasmique chez le tournesol. *Ann. Amélior. Plant.*, **19** (2), 99-106.
- Leclercq P.**, 1971. La stérilité mâle cytoplasmique du tournesol. I. Premières études sur la restauration de fertilité. *Ann. Amélior. Plant.*, **21** (1), 45-54.
- Leclercq P.**, 1979. La stérilité mâle cytoplasmique du tournesol. II. Influence de la génétique et du milieu sur la restauration de la fertilité. *Ann. Amélior. Plant.*, **29** (2), 201-212.
- Leclercq P.**, 1983. Etude de divers cas de stérilité mâle cytoplasmique chez le tournesol. *Agronomie*, **3** (2), 185-187.
- Reddy P. S., Thammi Raju B.**, 1977. Inheritance of fertility restoration in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Euphytica*, **26**, 409-412.
- Vranceanu V. A., Stoenescu F. M.**, 1971. Pollen fertility restorer gene from cultivated sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Euphytica*, **20**, 536-541.
- Vranceanu V. A., Stoenescu F. M.**, 1978. Genes for pollen fertility restoration in sunflowers. *Euphytica*, **27**, 617-627.