



HAL
open science

La complémentarité pour l'acquisition des ressources abiotiques dans les associations végétales : quels processus en jeu expliquant les performances ?

Laurent Bedoussac, Eric Justes, Philippe Hinsinger, Etienne-Pascal Journet, Gaëtan Louarn, Christophe Naudin, Elise Pelzer

► To cite this version:

Laurent Bedoussac, Eric Justes, Philippe Hinsinger, Etienne-Pascal Journet, Gaëtan Louarn, et al.. La complémentarité pour l'acquisition des ressources abiotiques dans les associations végétales : quels processus en jeu expliquant les performances ?. CIAG 2014 : Carrefours de l'Innovation Agronomique "Associations Végétales", Nov 2014, Angers, France. hal-02744205

HAL Id: hal-02744205

<https://hal.inrae.fr/hal-02744205v1>

Submitted on 20 Jun 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Les processus de complémentarité de niche et de facilitation déterminent le fonctionnement des associations végétales et leur efficacité pour l'acquisition des ressources abiotiques.

- ▶ Justes E, Bedoussac L, Corre-Hellou G, Fustec J, Hinsinger P, Jeuffroy M-H, Journet E-P, Louarn G, Naudin C, Pelzer E





Les associations végétales : définition et exemples

- Une association est la culture simultanée de deux espèces ou plus sur la même surface pendant une période significative de leur croissance (Willey, 1979)
- Une définition qui recouvre une diversité de systèmes :



Cultures annuelles



Systèmes prairiaux



Agroforesterie



Sylvopastoralisme



Arbres - Arbustes

- Principes de l'écologie (ex: interactions, diversité, services écosystémiques)
- Pratique traditionnelle plus ou moins répandue (PVD vs. Europe ; Alim. A. vs. H.)



Compétition pour l'utilisation de mêmes ressources

D'après : van Asten, Wairegi, Mukasa, Uringi (2011) - *Agricultural Systems* 104:326-334

- Dans les peuplements mono-spécifiques et pluri-spécifiques les plantes sont en compétition lorsqu'elles utilisent les mêmes ressources abiotiques, au même endroit et en même temps.



Compétition pour la lumière

Compétition pour l'eau et les minéraux




Culture de café mono-spécifique



Association caféier/banancier

Colombie ; www.fao.org

Produit Brut : 1170 vs 1745 \$/ha en SC vs IC → +49%






Complémentarité de niche dans les associations

D'après : Garnier et Navas (2011) ; Chesson (2000) ; Fridley (2001)

- La complémentarité de niche correspond à :
 - L'utilisation d'une même ressource de façon différée dans le temps ou dans l'espace
 - L'exploitation de formes biogéochimiques différentes



Parc à Faidherbia albida




Association blé dur-féverole



Complémentarité de niche asynchrone


- Exemple de l'utilisation asynchrone de l'eau dans les parcs à *Faidherbia albida*

Ong CK, Leakey RRB (1999)
Agroforestry Systems 45:109-129



- Plus des remontées capillaires
- Plus de l'enrichissement des strates superficielles du sol en MO par les feuilles


Roupsard O et al. (1999), *Functional Ecology* 13:460-472






Le plus souvent : compétition et complémentarité

Adapté de Bedoussac et al., *Agronomy for Sustainable Development* (Accepté)




- Compétition entre céréale et légumineuse pour l'acquisition de l'N minéral du sol
- Complémentarité de niche entre céréale et légumineuse (N_{min} vs N_2)
- Plus de N_2 fixé/plante mais moins de N_2 fixé/hectare





Facilitation : accéder à des ressources inaccessibles


- La facilitation correspond au cas où une espèce augmente la croissance ou la survie de l'espèce qui lui est associée (Callaway, 1995) à travers l'amélioration des conditions environnementales (température, ombre, disponibilité des ressources, ...)
 - Soit de façon directe :
interactions plante-plante
 - Soit de façon indirecte :
interactions via les communautés microbiennes et mycorhizes du sol






Les transferts d'azote entre plantes associées

D'après : Fustec J, Malagoli P, 2012, Ecole chercheurs - Montpellier



- Sol INRA Melgueil
- Pots de 10L
- Marquage ^{15}N limbes
- 1 pois associé à 2 blés





- Il existe des transferts faibles d'N entre plantes (<1% de l'N des plantes)
- Dans le cas des cultures annuelles le bilan est nul



Facilitation biogéochimique pour le Phosphore

D'après : Betencourt, Duputel, Colomb, Desclaux, Hinsinger (2012) - Soil Biol. Biochem. 46

- Mobilisation d'un pool de P initialement non disponible via des processus rhizosphériques engendrés par l'autre espèce





- Les modifications de pH sont faibles et n'expliquent pas l'augmentation de la disponibilité du P dans la rhizosphère





Complémentarité, compétition et facilitation pour accroître les rendements et la qualité des grains


D'après : Bedoussac et al., *Agronomy for Sustainable Development* (Accepté)






Complémentarité et facilitation surtout en conditions limitantes : Compétition Complémentarité

D'après : Bertness et Callaway, 1994



- Blé tendre - Féverole
- Blé tendre - Pois
- Orge - Féverole
- Orge - Pois
- Blé dur - Féverole
- Blé dur - Pois

D'après : Bedoussac et al.,
Agronomy for Sustainable Development (Accepted)





Conclusions et perspectives

- Compétition inter-spécifique peut rimer avec amélioration de la productivité et de la qualité des produits récoltés.....mais sous certaines conditions :
 - Pas de forte compétition pour les mêmes ressources (dans le temps, l'espace ou la forme chimique des nutriments) (ex. complémentarité « partielle » pour la lumière)
 - Occurrence de facilitation (ex. P) et/ou de complémentarité de niche (ex. N, eau)
- **Intérêts des cultures associées surtout en conditions limitantes**
- Complémentarités interspécifiques fonction des choix d'espèces, variétés, fertilisation, structure de peuplement...
- Des transferts d'N très faibles en cultures annuelles mais significatives en cultures pérennes pour expliquer l'amélioration des performances



Merci pour votre attention

- Bedoussac L., Journet E-P., Hauggaard-Nielsen H., Naudin C., Corre-Hellou G., Prieur L., Jensen E.S., Justes E., 2014. Chapter 3: Eco-Functional Intensification by Cereal-Grain Legume Intercropping in Organic Farming Systems for Increased Yields, Reduced Weeds and Improved Grain Protein Concentration. In: S. Bellon and S. Penvern (Eds.), "Organic Farming, prototype for sustainable agricultures?" Springer, Dordrecht, pp 47-64. ISBN 978-94-007-7926-6
- Pelzer E., Bazot M., Makowski D., Corre-Hellou G., Naudin C., Al Rifaï M., Baranger E., Bedoussac L., Biarnès V., Boucheny P., Carrouée B., Dorvillez D., Foissy D., Gaillard B., Guichard L., Mansard M.-C., Omon B., Prieur L., Yvergniaux M., Justes E., Jeuffroy M.H., 2012. Pea-wheat intercrops in low-input conditions combine high economic performances and low environmental impacts. European Journal of Agronomy. 40, 39–53.



Cultures annuelles



Systèmes prairiaux



Agroforesterie



Sylvopastoralisme



Arbres - Arbustes