

Etat de l'art des impacts écotoxicologiques des microplastiques sur les écosystèmes terrestres

Christian Mougin

▶ To cite this version:

Christian Mougin. Etat de l'art des impacts écotoxicologiques des microplastiques sur les écosystèmes terrestres. Séminaire de la Fédération Ile de France de Recherche sur l'Environnement, Jun 2019, Paris, France. hal-02788504

HAL Id: hal-02788504

https://hal.inrae.fr/hal-02788504


Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.





Le contexte



- Une utilisation mondiale intensive : 6,3 Md de T produites
- Une contamination générale des écosystèmes : 5,0 Md de T en décharge ou dans l'environnement
- Une connexion entre les environnements terrestres et les eaux de surface, puis les surfaces marines



Plastiques et écosystèmes terrestres (1)

Analyse WoS 1956-2016

```
plastic*: 401 063

plastic* AND ecotox*: 151

plastic* AND ecotox* AND soil*: 18

plastic* AND ecotox* AND terrestr*: 14

bioplastic*: 1 020

bioplastic* AND ecotox*: 5

bioplastic* AND ecotox* AND soil*: 2

bioplastic* AND ecotox* AND terrestr*: 1
```

 Depuis 2016, une littérature plus abondante (synthèses...) concernant les sols



Plastiques et écosystèmes terrestres (2)

- A l'origine de la contamination des écosystèmes (continentaux)
- Grande diversité de compositions chimiques (pétrole et bio)
- Prise en compte juridique et règlementaire indirecte
 - Echappent à Reach
 - U44-164 : inertes dans les amendements organiques
 - ISO 17556: 2012 : biodégradabilité aérobie
 - EN 13432:2000 : biodégradabilité et compostabilité des produits d'emballage
 - U52-001:2005 : caractérisation des matériaux de paillage pour l'agriculture et l'horticulture
 - NF T 51-800 et le projet CEN TC249 00249875:2016 sur les bioplastiques en agriculture : biodégradation et écotoxicité
 - ...



La contamination des sols

- Pas de données quantitatives directes > entrées
- Retombées atmosphériques
 - -100 items/m²/j en milieu urbain > 0,7 item/kg sol/j et 250 items/kg sol/an > 27 μ g/kg/an




(© G. Paillard, INRA)

- Produits résiduaires organiques
 - -Boues : 1000 items/kg MS > 170 items/kg sol/épandage, 1% de la MS des inertes
- Irrigation
 - -Maïs: 2000 m³/ha et 10000 part/m³ > 1 items/kg sol/cycle cultural
- Paillage (bioplastiques)-200 kg/ha > 130 mg/kg
- Sédiments : 1-10 items/kg



Quel devenir des plastiques dans les sols?






Premiers constats


- Une diversité inconnue (cinétiques, formes...)
- Un apport par certaines formes de PRO (boues, composts?)
- Une persistance établie : des fibres détectées dans les sols 15 ans après l'application de boues
- Une accumulation probable : le rôle fouisseur des vers de terre limite les réactions de photo-dégradation (vs t°)
- Les sols : des puits de plastiques, mais aussi des sources!
- L'exposition des organismes (sols et faune sauvage) est encore peu étudiée, de même que les transfert dans les réseaux trophiques

Des cocktails de contaminants physiques et chimiques

- **♦ Monomères constituants : PE, PS, PVC, PP, PET**
- Catalyseurs : métaux
- Additifs : phtalates, retardateurs de flamme, bisphénols A et F...
- Matériaux de charge : talc, dioxyde de Ti
- Polluants du milieu adsorbés : cocktails de métaux et d'organiques
- Espèces invasives fixées (eaux) : sols ?
- Questions : quantités, expositions, impacts ?



Quel impact des plastiques sur les organismes?



Quel impact des plastiques sur les populations, communautés, écosystèmes?

- Diminution de la prise d'aliment
 - Perte de vigueur

.].

Sous-alimentation

- DIOCUEC ITICSCITIUI
- Blocage de la sécrétion d'enzymes gastriques •
- Diminution de l'appétit
- Perturbation du métabolisme lipidique
- Diminution des taux d'hormones stéroïdiennes
- Perturbation de la respiration

Effets sur la reproduction et le développement

Retard d'ovulation

Retard de croissance

Œdème péricardien

Malformations

Neurotoxicité

r er turbation uu rytiime caruidque

Retard de maturité





L'évaluation expérimentale sur Lumbricus terrestris (1)

- Mésocosmes contenant de 0 à 1,2 % (p/p) de poudre de PE (< 400 µm) dans la litière déposée en surface
- Exposition de 14 et 60 jours
- A 60 jours :
 - -mortalité ≯ à ≥ 0,4 %
 - -croissance > à ≥ 0,4 %
 - -ingestion ≯ à ≥ 0,4 %
 - -nombre de galeries > à = 0,4 %
 - -pas d'effet sur la reproduction (production et biomasse des cocons)
 - -pas d'effet sur le positionnement vertical des vers
- Effets possibles sur la décomposition de la matière organique et les cycles biogéochimiques

(Lwanga et al., Environ Sci Technol 2016)



L'évaluation expérimentale sur Lumbricus terrestris (2)


- Ingestion de litière contenant de 0 à 15 % (p/p) de poudre de PE en boite de Petri > turricules
- Exposition de 4 jours
- ❖ A 4 jours :
 - -pas de mortalité
 - -croissance > à 1 et 15 %
 - -bioconcentration en plastiques dans turricules et TD 0,45 % (p/p)
 - -excrétion taille-dépendante
- Incorporation au sol et transfert possible dans les réseaux trophiques





Le transfert dans les réseaux trophiques

L'exemple des PCBs (Tarradellas) ppb



Concentration en PCBs

Mais aussi : hérissons, sangliers...



Et la faune sauvage?

SCIENCE AND SOCIETY

Wildlife cancer: a conservation perspective

Denise McAloose and Alisa L. Newton

Abstract | Until recently, cancer in wildlife was not considered to be a conservation concern. However, with the identification of Tasmanian devil facial tumour disease, sea turtle fibropapillomatosis and sea lion genital carcinoma, it has become apparent that neoplasia can be highly prevalent and have considerable effects on some species. It is also clear that anthropogenic activities contribute to the development of neoplasia in wildlife species, such as beluga whales and bottom-dwelling fish, making them sensitive sentinels of disturbed environments.

Nature Reviews Cancer 9, 517–526 (2009)

CORRESPONDENCE

Increase of wildlife cancer: an echo of plastic pollution?

Thomas Erren, Dominique Zeuß, Frank Steffany and Benno Meyer-Rochow

Nature Reviews Cancer 9, 842 (2009)



En conclusion

Une urgence : s'intéresser aux écosystèmes terrestres!

Des challenges pour la recherche

- Quantifier les flux de plastiques et produits apparentés/associés
- Quantifier l'exposition des populations au cours du temps (exposome)
- Connaitre l'impact des composés chimiques en mélange et leurs effets cumulatifs
- Connaitre les sites d'interaction intra-organismes et leurs interactions
- Connaitre les effets trans-générationnels consécutifs à l'exposition

Des besoins en outils

- Améliorer les méthodes d'analyse en matrices complexes
- Développer des biomarqueurs d'exposition
- Développer des méthodes statistiques pour aborder les expositions multiples
- S'inspirer des travaux sur les nanomatériaux (propriétés/devenir, exposition, interactions avec les récepteurs...)?





∆groParisTech



