HAL open science

23 types de prairies auvergnates vous dévoilent leurs atouts

Anne A. Farruggia

To cite this version:

Anne A. Farruggia. 23 types de prairies auvergnates vous dévoilent leurs atouts. Sommet de l'Elevage, Oct 2012, Cournon, France. pp.3, 2012. hal-02802778

HAL Id: hal-02802778

https://hal.inrae.fr/hal-02802778v1

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

23 types de prairies auvergnates

vous dévoilent leurs atouts…

PRODUCTION

ENVIRONNEMENT

QUALITE DU FROMAGE

Prairies AOP

Un projet partagé

12 : un type qui gagne à être connu…

La clé pour le trouver



Ses valeurs agricoles et environnementales

Quantité

- Potentiel de production au printemps



- Production annuelle estimée en année moyenne
  - Potentielle 8,7 t MS/ha
  - Accessible 6,9 t MS/ha

Qualité nutritive

- Potentiel de qualité au printemps pour un fourrage vert



Stock de matières organiques dans le sol

10 premiers cm



Rapport C/N

Biodiversité végétale

- Richesse spécifique



- Rareté



- Habitats
  - CORINE biotopes : 38.3
  - Natura 2000 : 6520
  - Statut : habitat d'intérêt communautaire
  - Cahiers d'habitats agropastoraux : 6520-1 : Prairies fauchées montagnardes et subalpines du Massif central

La composition de sa végétation

Espèces dominantes

Graminées	Légumineuses
Agrostide commun	Trèfle blanc
Crételle	**Diverses**
Dactyle aggloméré	Céraiste commun
Fétuque rouge	Crépis bisannuel
Flouve odorante	Grande berce
Houlque laineuse	Grande oseille
Pâturin commun	Knautie d'Auvergne
Trisète jaunâtre	Pissenlit
	Renouée bistorte

Espèces caractéristiques du régime de fauche

Crépis bisannuel	Salsifis des prés
Knautie d'Auvergne	Trisète jaunâtre

Services agricoles

- Rendement

- Saisonnalité de la production

À 700°.j, 60 % des graminées ont atteint l'épiaison.

À 1 200°.j, 50 % des graminées ont atteint la floraison.

- Qualité nutritive du fourrage vert à 900°.j

- Souplesse d'exploitation

- Production laitière permise

*Lait couvert par le **foin** (sans apport de concentrés) dont l'ingestion varie de **16 à 19 kg MS/jour** pour une vache standard*

Services écologiques et environnementaux

- Potentiel de stockage de carbone

- Intérêt patrimonial au plan botanique

- Diversité des couleurs de fleurs

- Capacité d'accueil des pollinisateurs

- Capacité d'accueil de la faune

Services pour la qualité des fromages

Herbe sur pied

- Potentiel sensoriel
  - Couleur de la pâte **1/4**
  - Richesse aromatique **4/4**
- Potentiel nutritionnel
  - Antioxydants **4/4**
  - Teneur en acides gras insaturés d'intérêt nutritionnel **3/4**

Evolution possible



Au final, un type qui concilie les services agronomiques et les services environnementaux

Un projet partagé

L’herbe, on en parle