HAL
open science

Arcitecture nucléaire 3D et expression du génome

Martine Yerle-Bouissou, Yvette Lahbib Mansais, Florence Mompарт, Hervé Acloque, David Robelin

► **To cite this version:**

Martine Yerle-Bouissou, Yvette Lahbib Mansais, Florence Mompарт, Hervé Acloque, David Robelin. Architecture nucléaire 3D et expression du génome. Séminaire du Département de Génétique Animale, Apr 2014, Fréjus, France. 2013. hal-02810380

HAL Id: hal-02810380

<https://hal.inrae.fr/hal-02810380>

Submitted on 6 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Architecture nucléaire 3D et expression du génome

Y. Lahbib-Mansais, F. Mompert, H. Acloque, D. Robelin, M. Yerle-Bouissou

UMR1388 Génétique, Physiologie et Systèmes d'Élevage, INRA-ENVT-ENSAT, F-31326 Castanet-Tolosan, France

Contexte

Une étape importante a été franchie dans la connaissance des génomes grâce au développement des cartes génétiques et physiques des gènes et de leurs séquences régulatrices. Cependant, ceci demeure insuffisant pour comprendre la régulation **spatio-temporelle de l'expression des gènes, notamment par des mécanismes épigénétiques impliquant différents composants cellulaires**. De nombreuses études ont permis de mettre en évidence que le noyau est un compartiment dynamique très organisé et complexe (revue Bickmore and Van Steensel, Cell 2013), divisé en sous domaines qui ont tous une fonction spécifique et rassemblent certains facteurs biologiques.

Objectifs

Les projets développés visent à comprendre la relation fonctionnelle entre l'architecture nucléaire et l'expression des gènes, à mesurer les effets des modifications structurelles et épigénétiques sur cette organisation.

Au travers de plusieurs modèles, nous étudions:

- ✓ l'**organisation nucléaire** des territoires chromosomiques, des centromères et des télomères (cellules immunitaires: lymphocytes, neutrophiles et macrophages, gamètes mâles)
- ✓ les **modifications spatiales de l'organisation nucléaire lors d'un processus d'activation cellulaire** (cellules immunitaires) ou en présence de **remaniements chromosomiques** (gamètes)
- ✓ la **corrélation** entre **position nucléaire** de gènes cibles et leur **niveau d'expression**.
- ✓ dans un même noyau, l'**environnement nucléaire des deux allèles** d'un gène à expression **mono-allélique** (empreinte parentale IGF2).
- ✓ l'**interaction** entre gènes portés par des chromosomes différents (ex cas de gènes soumis à empreinte).

Résultats

Organisation des Territoires Chromosomiques, des télomères et des centromères

Territoires Chromosomiques

Neutrophiles
Cas particulier d'un noyau polylobé

- ✓ Les TC homologues se distribuent indépendamment l'un de l'autre **dans les lobes**.
- ✓ Leur volume **n'est pas proportionnel** à leur taille en MegaBase.
- ✓ L'activation par le LPS implique une **décondensation** de certains TC.

Télomères

Métaphase 76 spots
Neutrophiles ~18 spots
Neutrophiles Association pq

Séquence répétée télomérique
1 qter, 1 pter, SSC1

- ✓ Organisation des télomères **en clusters** de 4 télomères.
- ✓ Associations préférentielles entre les extrémités p et q d'un même chromosome suggérant une **organisation en boucle dans l'espace nucléaire**.

Centromères

- ✓ Formation de **chromocentres** (2 centromères/cluster).
- ✓ **Pas d'associations** entre séquences de **nature différente** dans les cellules somatiques et dans les gamètes

AC6 (acrocentriques), SSCSR2A (métacentriques)

Yerle-Bouissou et al Chromosome Research, 2009; Acloque et al PlosOne, 2013; Mompert et al BMC Cell Biology, 2013

Des gènes sur exprimés se repositionnent dans l'espace nucléaire lors de l'activation des macrophages, alors que les gènes sous exprimés ne changent pas de position

✓ **IL8 sur exprimé** lors de l'activation des macrophages se repositionne à l'extérieur de son TC (p=0,0035).

✓ par contre, **TUBA3 sous exprimé** ne change pas de position

La translocation Roberstosienne t(13;17) affecte la morphologie et la localisation des territoires chromosomiques 13 et 17 dans les spermatozoïdes

✓ Animaux contrôles: **chr 13** forme **très allongée** et situé à la **périphérie** du noyau spermatique, alors que **chr 17** forme **ronde** et situé au **centre**

✓ Animaux porteurs de t(13;17): **chr 13 adopte la forme et la position** du chr 17.

Position nucléaire d'allèles exprimés/non exprimés Modèle de l'empreinte parentale (IGF2)

Statut d'empreinte IGF2 (foie stade foetal 90 j)

DNA IGF2 + Chr.2, RNA IGF2, RNA + DNA, RNA + DNA + Chr.2

✓ IGF2: expression **mono allélique**

Position des allèles exprimés et non exprimés / chr 2 (TC)

✓ **Pas de position spécifique** d'un des 2 allèles

Expression IGF2 / Nucléole (position, volume)

Interaction entre gènes: IGF2 / DLK1

Lahbib-Mansais et al (manuscrit en préparation)

Méthodologie

- **Sondes:**
 - Peintures chromosomiques
 - Banque de BACs (CRB GADIE, INRA Jouy-en-Josas, France)
 - Outils de génération automatique de sondes (GlintFish, Thomas Faraut)
- **Hybridation In Situ en Fluorescence:**
 - 3D-DNAFISH (Gènes, Territoires Chromosomiques (TC))
 - 3D-RNA FISH (ARN naissants)
 - Combinaison 3D-RNA/DNA FISH
- **Microscopie confocale** (Plateforme Imagerie TRI-Toulouse)
- **Analyse d'images en 3D** (logiciel NEMO): Segmentation d'objets, mesures de distances en 3D entre les objets.

Financements: Projet GENANIMAL, Projet européen SABRE (WP2), Projets Dept GA: « IGF2 interact » et « Archimac ».