



HAL
open science

Le choix des especes forestieres dans la plaine de Haguenau

Jean Braud, Jean-Luc Dupouey, Xavier Gauquelin, Pierre Geldreich, Anne
Madesclaire, Philippe Thévenet

► **To cite this version:**

Anne Madesclaire (Dir.). Le choix des especes forestieres dans la plaine de Haguenau. Centre Regional de la Propriete Forestiere, 34 p., 1990. hal-02846515

HAL Id: hal-02846515


<https://hal.inrae.fr/hal-02846515>

Submitted on 7 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

LE CHOIX DES ESSENCES FORESTIÈRES DANS LA PLAINE DE HAGUENAU



GUIDE POUR L'IDENTIFICATION DES STATIONS

Ce guide a été réalisé par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine-Alsace, en collaboration avec l'Office National des Forêts, Direction Régionale Alsace et Division de Haguenau et l'Institut National de la Recherche Agronomique.



LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL RÉGIONAL

AVANT-PROPOS

Après les guides des Vosges du Nord et du Sundgau, la collection s'enrichit avec celui consacré à la plaine de HAGUENAU, dont les surfaces boisées représentent, à elles seules, les trois quarts de la superficie forestière de plaine du département du Bas-Rhin.

Dans ces forêts, le Pin sylvestre a été privilégié au détriment d'autres essences, pourtant très appréciées et recherchées par les professionnels, telles que les Chênes.

Il a paru sage de chercher à rétablir un certain équilibre, en tirant le meilleur parti des potentialités des différents types de milieux, c'est-à-dire en faisant en sorte que chaque essence soit cultivée sur son terrain de prédilection.

La réussite de cette entreprise passe par la mise à disposition du sylviculteur et du reboiseur d'un outil accessible, synthèse d'études très poussées sur un écosystème des plus complexes.

Cette tâche a été menée à bien par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine-Alsace, en liaison avec d'autres partenaires (Office National des Forêts, Institut National de la Recherche Agronomique).

En apportant une contribution significative à l'élaboration et à la publication de ce guide de références, le Conseil Régional d'Alsace offre, à tout gestionnaire de ces forêts, l'opportunité de les valoriser encore mieux sur le plan économique mais aussi d'en faire un atout sur le plan écologique et touristique.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line extending to the right.

Marcel RUDLOFF
Sénateur du Bas-Rhin


1 OBJECTIF

Aider le sylviculteur et le reboiseur de la Plaine de Haguenau à choisir les essences forestières les mieux adaptées à sa forêt, à partir d'observations simples et rapides concernant les stations forestières.

2 LA STATION FORESTIÈRE

Une **station** est une étendue de terrain, de superficie variable, homogène quant au climat, à la géologie, au relief, au sol et à la végétation.

Dès que le relief ou la géologie ou le sol change, la station forestière varie (exemple : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...) :



Mais, dès que réapparaissent des conditions similaires, on retrouve des stations très semblables (1 et 1 bis, 2 et 2 bis, 3 et 3 bis par exemple). Celles-ci peuvent être regroupées en **types de station** caractérisés par un climat, un relief, une géologie, un sol, une flore particuliers.

Dans les stations appartenant à un même type, chaque essence aura une production déterminée.

3

ZONE D'UTILISATION DU GUIDE

Limites

La zone d'utilisation du guide comprend les **dépôts alluviaux** des rivières du Nord de l'Alsace. Ceux-ci s'individualisent en trois unités d'importance inégale : au Nord, les dépôts de la Lauter, au centre, ceux de la Sauer et la Moder, au Sud, ceux de la Zorn.

Dès la fin de l'ère tertiaire, ces cours d'eau ont déposé sur des épaisseurs variables, des alluvions sablo-argileuses en provenance des Vosges du Nord. Les zones de dépôt ainsi constituées forment de vastes surfaces au relief inexistant, faiblement inclinées en direction du Rhin. Entre ces zones, s'étendent des régions de loess, essentiellement vouées à l'agriculture. Il s'agit, au Nord, de l'« Outre-Forêt » et au Sud, de l'ensemble « collines de Brumath-Kochersberg ».

A l'Ouest, la limite de la plaine de Haguenau est marquée par la région des collines sous-vosgiennes, au relief plus contrasté. Son tracé remonte le long des vallées jusqu'à Woerth, Reichshoffen et Pfaffenhoffen. La Zang, Stocklach et le bois de Mietesheim, bien que légèrement vallonnés, peuvent être intégrés au massif de Haguenau.

A l'Est, c'est la limite du Ried alsacien qui sépare les zones alluviales d'origine vosgienne de l'ancien lit majeur du Rhin. Au niveau du massif de Haguenau proprement dit, il s'agit d'un escarpement de faille récent, très visible sur le terrain entre Bischwiller et Seltz, car il constitue un talus d'une hauteur d'environ vingt mètres.


Caractéristiques géologiques

La région naturelle des alluvions vosgiennes du Nord de l'Alsace présente des formations superficielles d'une extrême hétérogénéité.

- Les **marnes** d'âge oligocène, situées sous les alluvions vosgiennes, affleurent au coeur de la forêt indivise de Haguenau. Ce sont des argiles de couleur gris verdâtre, parfois mélangées à des sables et limons en surface, et sur lesquelles se développent des sols lourds, favorables au Chêne pédonculé.
- Les **alluvions vosgiennes**, d'âge pliocène et quaternaire, sont composées de sables fins à grossiers de teinte jaune-rouille à blanc grisé, et de graviers avec d'éventuelles poches d'argiles intercalées. La présence de ces argiles exploitées par les potiers de Betschdorf et Soufflenheim, conduit à la formation de nappes d'eau superficielles. Leur étendue et leurs contours très variables constituent un facteur important de différenciation des types de sol et de végétation.

Quelques formations marginales se rencontrent de façon localisée dans la zone d'utilisation du guide.

- Les **loess** (limons) peuvent recouvrir certaines buttes du massif de Haguenau et apparaître en limite des alluvions vosgiennes. Le haut (altitude supérieure à 175 m) des forêts de Herrenwald, d'Uhlwiller et d'Ohlungen, au Sud-Ouest du massif, en est un exemple typique.
- Les **alluvions très récentes du sillage immédiat des rivières**, constituées de sables fins, limons et argiles, sont à l'origine de formations forestières riches en feuillus précieux tel le Frêne.
- Les **formations tourbeuses** en situation de cuvette, ou du pied de l'escarpement de faille bordant le Rhin, sont un terrain de prédilection pour l'Aulnaie.



4

COMMENT IDENTIFIER UNE STATION FORESTIÈRE DANS LA PLAINE DE HAGUENAU ?



« L'Osmonde royale, espèce rare à protéger » (Photo : R. THOMAS)

Une parcelle ou un massif forestier comprennent généralement plusieurs types de station.

La démarche suivante facilite leur identification :

Localisation

Il est difficile de **se localiser** en l'absence de relief ... Quelques repères existent cependant pour certaines stations : bas de la terrasse, bord de ruisseau, dépression, dune.

Observation de la végétation

Certaines plantes sont de fidèles indicatrices des caractéristiques de la station (excès d'eau, acidité, richesse chimique, etc...). Une trentaine d'entre elles méritent, à ce titre, d'être observées dans la région étudiée :

- dans les **peuplements forestiers** : Chênes pédonculé et sessile, Hêtre, Frêne, Aulne glutineux, Charme, Pin sylvestre. Attention, pourtant, au marteau du forestier, qui a pu faire disparaître certaines essences des stations où l'on s'attendrait à les rencontrer !

- parmi les **plantes herbacées** : Molinie, Myrtille, Lierre, Oxalis, Primevère, Arum, ...
Il est important de rechercher ces plantes jusqu'aux lisières et trouées, car la densité du couvert forestier limite parfois leur développement. Leur reconnaissance est facilitée par les croquis rassemblés à la fin du guide.

Observation du sol

Le sol s'observe en creusant une **fosse** dont la profondeur varie, selon les cas, entre 30 et 80 cm. Pour repérer d'éventuelles variations ou confirmer ses observations, il est recommandé de creuser plusieurs fosses.

La fosse montre une **coupe de sol** dont l'examen permet de mettre en évidence les facteurs favorables et défavorables à la croissance des arbres.

5 QUE FAUT-IL OBSERVER SUR LA COUPE DU SOL ?

Quelles sont l'épaisseur et la composition de la litière ?

Il s'agit d'examiner l'amas de **feuilles**, d'**aiguilles**, et de **débris végétaux** (fragments de feuilles et d'aiguilles) recouvrant le sol, et plus ou moins rapidement **décomposés** par les champignons, les petits animaux et les bactéries.

Une litière moyennement épaisse à épaisse, où l'on reconnaît les feuilles et aiguilles entières et les débris végétaux mal décomposés, indique un sol pauvre.

Une absence de litière ou une litière peu épaisse, constituée de feuilles de l'année et d'aiguilles en voie de décomposition, indique un sol riche.

Quels sont les constituants principaux des différentes couches du sol ?

Sur la coupe du sol, on cherche à distinguer plusieurs **couches**, caractérisées par une **couleur** ou des **constituants** différents.

Un échantillon de terre est formé de constituants qui peuvent être de taille variable ; des plus grossiers aux plus fins, ce sont les sables, les limons, les argiles.

En frottant entre les doigts un échantillon de terre, on reconnaît l'élément qui prédomine :

les **sables** grattent les doigts,

les **limons** à l'état sec, sont poussiéreux et tachent les doigts ; humides, ils s'étalent sur les doigts sans coller lorsqu'on les malaxe,

les **argiles** à l'état sec, forment des blocs durs ; humides, elles sont collantes et se travaillent comme de la pâte à modeler.

Le sol présente-t-il, temporairement ou en permanence, un excès d'eau ?

Une **nappe d'eau**, localisée plus ou moins près de la surface, s'observe fréquemment, **toute ou partie de l'année**, dans les sols de la plaine de Haguenau.

Selon la saison et selon la profondeur à laquelle la nappe apparaît, celle-ci est soit un handicap (excès d'eau freinant l'enracinement, la respiration et la nutrition des arbres, souvent sensible en hiver et au printemps), soit un avantage (bonne alimentation en eau l'été), vis-à-vis de la croissance des essences.

La **présence et le niveau de la nappe** se détectent de la façon suivante : en creusant, on rencontre un matériau humide, puis après quelques minutes, l'eau apparaît au fond du trou. Mais dans certains cas, l'eau n'est plus visible en période sèche.

Comment déceler alors la présence temporaire d'eau ?

Elle se traduit par des **taches plus ou moins marquées** (en couleur, taille et densité), et **plus ou moins proches de la surface** :

- taches **rouille**, au minimum de la taille d'un « confetti », dispersées dans le sol, indiquant des difficultés légères de drainage, à certaines périodes de l'année,
- taches rouille nombreuses, plus ou moins jointives, exprimant des difficultés sérieuses de drainage à certaines périodes de l'année,
- taches **rouille et grises (sol « bariolé »)** correspondant à un engorgement fréquent et prolongé.

Une couche particulière apparaît-elle en profondeur dans le sol ?

Il peut s'agir d'un sable blanc ou orangé, d'une couche argileuse dure, d'une couche bariolée de rouille et de gris, ou d'une couche grise à odeur d'oeuf pourri.

Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de creuser ; sinon, on continue jusqu'à 80 cm environ.



« Pins sylvestres » (Photo : J. TIMBAL)



« Vue du massif de Haguenu depuis les collines de l'Outre-forêt » (Photo : P. GELDREICH)

Vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour identifier une station forestière.

Le tableau suivant, dans lequel vous progressez de gauche à droite, vous donne la démarche à suivre. A l'aide des observations que vous venez d'effectuer sur la localisation, le sol et la végétation, vous déterminez le numéro du type de station et vous vous reportez à la fiche descriptive correspondante :


- résumant les caractères du type de station (confirmation de l'identification),
- dégagant les facteurs favorables ou limitants de la production forestière,
- et conseillant le choix des essences à favoriser.

Certains cas particuliers ont été volontairement exclus par souci de simplification ; bien évidemment, ils correspondent à des situations exceptionnelles.

Le choix des essences est présenté dans chaque fiche selon une hiérarchie qui résulte de la confrontation des connaissances actuelles sur le comportement des essences, avec les facteurs économiques et financiers.

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE RÉPARTITION DES TYPES DE STATION DANS LE MASSIF DE HAGUENAU


Nature géologique du terrain



Peuplements actuels



« Pins sylvestres » (Photo : LUDMANN)



- Présence fréquente d'Aulnes
 - Bord de ruisseau, dépression, ou bas de la terrasse de Haguenau
- Absence de Molinie et de Myrtille
 - Sol à dominante argileuse ou limoneuse
 - Litière absente ou peu épaisse
 - Présence possible de Circée de Paris
 - Charme souvent abondant et constant dans le sous-étage
- Absence de Molinie et de Myrtille
 - Sol à dominante sableuse ou argileuse
 - Litière moyennement épaisse
 - Absence du Frêne
 - Sous-étage éventuel de Charmes ou de Hêtres
- Présence de Molinie, de Myrtille ou de Canche flexueuse
 - Sol à dominante sableuse
 - Litière épaisse
 - Absence ou rareté du Charme, dispersé dans le sous-étage
- Sable pur (parfois en dune)
 - Tapis de Canche flexueuse avec présence de Callune
 - Absence du Hêtre

- Nappe d'eau à la surface du sol toute l'année
 - Bas de la terrasse de Haguenau
 - Présence d'une couche tourbeuse, très épaisse, en surface
 - Quasi-absence du Frêne dans le peuplement
- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
 - Bord de ruisseau ou dépression
 - Présence fréquente du Frêne dans le peuplement
- Fréquence du Frêne et présence possible d'Aulne
 - Présence fréquente de Primevère, d'Arum et d'Ail des ours
 - Litière absente
- Rareté du Frêne et absence d'Aulne
 - Absence de Primevère, d'Arum et d'Ail des ours
 - Litière peu épaisse
- Absence de nappe d'eau dans le sol
 - Absence d'argile dans le sol
 - Absence de Canche cespiteuse
- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
 - Présence d'une couche argileuse plus ou moins profonde
 - Présence fréquente de Canche cespiteuse
 - Tapis fréquent de Crin végétal
- Présence possible de Chèvrefeuille, d'Oxalis, de Sceau de Salomon, ou de Lierre
 - Charme dispersé dans le sous-étage
 - Litière épaisse
- Absence de Chèvrefeuille, d'Oxalis, de Sceau de Salomon et de Lierre
 - Absence du Charme
 - Litière très épaisse
- Absence de Chèvrefeuille, d'Oxalis, de Sceau de Salomon et de Lierre
 - Molinie en grosses touffes couvrant le sol
 - Présence de Sphaignes
 - Nappe d'eau permanente

Ruisseau

Dunes

Talus

Ried

Sud-Est


9

2

7-9

12

1



N°1

- Végétation herbacée luxuriante composée d'Iris, de Grand Carex et de Reine des prés

N°2

- Végétation herbacée non luxuriante
- Absence d'Iris, de Grand Carex et de Reine des prés

N°3

N°4

N°5

N°6

- Sol sec, même en hiver
- Couche brun clair ou ocre, sableuse, bien individualisée
- Charme très dispersé dans le sous-étage

N°7

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Sol de couleur beige à grise, avec de grandes taches décolorées
- Charme parfois bien représenté dans le sous-étage

N°8

- Sol sec, même en hiver
- Couche ocre, sableuse, bien individualisée

N°9

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Couche sableuse, décolorée, pouvant devenir totalement blanche
- Molinie à fort développement dans les trouées

N°10


N°11

N°12

T
Y
P
E
S

D
E

S
T
A
T
I
O
N



« Pin sylvestre » (Photo : X. GAUQUELIN)



Tournez la page.

TYPE DE STATION N° 1

Peuplement et végétation

- Peuplement composé en majorité d'Aulnes, quasi-absence du Frêne
- Végétation herbacée luxuriante
- Présence fréquente de Grand Carex


Localisation et fréquence

- Bordure Nord de la vallée de la Moder
- Au pied de la terrasse de Haguenau, sur les formations tourbeuses de bas de pente (bordure Est et Sud-Est du massif)
- Rare et localisé



« Gley » (Photo : J.L. DUPOUEY)

Coupe schématique du sol



GLEYS TOURBEUX

Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau à la surface du sol toute l'année
- Couche de surface noire, grasse, et très épaisse (entre 50 cm et 1 m), surmontant éventuellement une couche grise à odeur d'oeuf pourri

Facteurs limitants

- Nappe d'eau à la surface du sol toute l'année

Facteurs favorables

Fertilité

Très faible

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Possibles

A éviter

Aulne glutineux

Épicéa

Peupliers

Précautions et conseils

Les investissements sont à éviter sur ces stations.

TYPE DE STATION N° 2

Peuplement et végétation

- Peuplement composé d'Aulnes et de Frênes
- Végétation herbacée luxuriante
- Présence fréquente d'Iris, de Grand Carex et de Reine des prés


Localisation et fréquence

- Surtout le long des ruisseaux, ou dans les dépressions
- Rare et localisé



« Aulnaie - Frênaie à Iris et Grand Carex » (Photo : X. GAUQUELIN)

Coupe schématique du sol



SOL A GLEY PROFOND

Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Absence de litière, bonne décomposition des débris végétaux
- Sol limoneux et argileux ; présence possible de sable
- Taches rouille dès la surface
- Apparition, vers 80 cm de profondeur, d'une couche grise à odeur d'oeuf pourri

Facteurs limitants

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps

Facteurs favorables

- Bonne alimentation en eau l'été
- Richesse chimique du sol élevée

Fertilité

Élevée

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Frêne
Aulne glutineux

Possibles

Chêne pédonculé
Peupliers

A éviter

Épicéa

Précautions et conseils

- Réserver l'Aulne aux situations les plus humides.
- Il n'est pas conseillé de drainer ces sols.
- Risques de gelées tardives sur le Frêne et les Peupliers.
- En bordure de rivière, il est préférable de planter au printemps pour éviter un déchaussement des plants.
- Utiliser, si possible, des plants de grande taille.

TYPE DE STATION N° 3

Peuplement et végétation

- Peuplement de Chênes pédonculés et de Frênes, avec présence possible d'Aulnes ou de Hêtres
- Sous-étage de Charmes constant
- Présence fréquente de semis de Frêne
- Végétation herbacée non luxuriante, mais couvrant totalement le sol
- Présence fréquente de Primevère, d'Arum, d'Ail des ours, de Canche cespiteuse et de Lierre terrestre
- Présence possible de Circée de Paris ou de Violette
- Absence d'Iris, de Grand Carex et de Reine des prés


Localisation et fréquence

- sur les marnes, ou en bord de ruisseau
- Assez fréquent et assez étendu



« Ail des ours » (Photo : P. GELDREICH)

Coupe schématique du sol



Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Litière absente, très bonne décomposition des débris végétaux
- Sol très argileux sur les marnes, ou limoneux en bord de ruisseau
- Taches rouille marquées dès 20 cm de profondeur
- Apparition d'une couche argileuse gris verdâtre à faible profondeur sur les marnes

Facteurs limitants

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps

Facteurs favorables

- Richesse chimique du sol très élevée

Fertilité

Élevée

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Frêne
Chêne pédonculé

Possibles

Peupliers

A éviter

Chêne rouge
Épicéa
Douglas
Pin Weymouth
Épicéa de Sitka

Précautions et conseils

- Sol sensible au tassement : limiter le passage d'engins lourds.
- Dans les régénérations, risque d'envahissement par le Charme.
- Rechercher la régénération naturelle du Frêne.

TYPE DE STATION N° 4

Peuplement et végétation

- Peuplement de Chênes pédonculés avec présence possible de Hêtres ; rareté du Frêne ; absence de l'Aulne
- Sous-étage de Charmes constant
- Présence fréquente de semis de Frêne
- Présence fréquente de Canche cespiteuse
- Présence possible de Circée de Paris ou de Violette
- Absence de Primevère, d'Arum, d'Ail des Ours et de Lierre terrestre


Localisation et fréquence

- Fréquent et étendu



« Pseudogley » (Photo : J.L. DUPOUEY)

Coupe schématique du sol



Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Litière discontinue, peu épaisse, composée uniquement des feuilles de l'année ; bonne décomposition des débris végétaux
- Sol argileux (recouvert de sables et de limons en surface)
- Taches rouille marquées dès 20 cm de profondeur
- Apparition d'une couche argileuse gris verdâtre en profondeur

Facteurs limitants

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Risque de sécheresse estivale

Facteurs favorables

- Richesse chimique du sol élevée

Fertilité

Élevée

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Chêne pédonculé

Possibles

Chêne sessile

A éviter

Chêne rouge
Épicéa
Douglas
Pin Weymouth
Épicéa de Sitka

Précautions et conseils

- Sol sensible au tassement : limiter le passage d'engins lourds.
- Dans les régénérations, risque d'invasion par le Charme.

TYPE DE STATION N° 5

Peuplement et végétation

- Peuplement de Chênes pédonculés et sessiles, avec présence possible de Hêtres, ou de Pins sylvestres
- Absence du Frêne
- Sous-étage éventuel de Charmes ou de Hêtres
- Présence possible de Maïanthème, de Luzule blanchâtre, de Chèvre-feuille ou de Fougère aigle
- Absence de Canche cespiteuse


Localisation et fréquence

- Assez fréquent et assez étendu



« Maïanthème » (Photo : X. GAUQUELIN)

Coupe schématique du sol



SOL BRUN ACIDE

Caractères essentiels du sol

- Absence de nappe d'eau dans le sol
- Litière moyennement épaisse, continue, composée de feuilles et aiguilles entières et fragmentées, avec quelques filaments blancs
- Absence de couche noire sous-jacente
- Sol sableux (avec limons éventuels en surface), absence d'argile

Facteurs limitants

Facteurs favorables

- Sol profond
- Richesse chimique du sol moyenne

Fertilité

Moyenne

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Chêne sessile
Chêne rouge
Douglas
Mélèze d'Europe

Possibles

Hêtre
Érable sycomore
Merisier
Épicéa
Pin sylvestre

A éviter

Pin Weymouth
Épicéa de Sitka

Précautions et conseils

- Il est dommage, sur ces stations, de cultiver l'Épicéa et le Pin sylvestre.
- Le Merisier n'est envisageable que sur les sols riches en limons.
- Un labour préalable est favorable à la reprise et à la croissance des plants.

TYPE DE STATION N° 6

Peuplement et végétation

- Peuplement de Chênes pédonculés (ou rarement de Hêtres) avec présence possible de Chênes sessiles ou de Pins sylvestres
- Absence du Frêne
- Sous-étage composé le plus souvent de Charmes avec des Hêtres
- Tapis fréquent de Crin végétal
- Présence fréquente de Canche cespiteuse


Localisation et fréquence

- Fréquent et étendu



« Crin végétal » (Photo : X. GAUQUELIN)

Coupe schématique du sol



PSEUDOGLEY PODZOLIQUE

Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Litière continue, moyennement épaisse, composée de feuilles et aiguilles entières et fragmentées, avec des filaments blancs
- Sol sableux (avec limons éventuels en surface)
- Description :
 - Couche brun noir (15 cm d'épaisseur environ) en surface
 - Couche sous-jacente comportant des taches grisâtres et rouille
 - Présence d'une couche argileuse plus ou moins profonde

Facteurs limitants

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Richesse chimique du sol faible

Facteurs favorables

Fertilité

Moyenne

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Chêne sessile
Pin sylvestre

Possibles

Chêne pédonculé

A éviter

Épicéa
Douglas
Mélèze d'Europe

Précautions et conseils

- Sur ces stations, un drainage et un labour préalables favorisent la reprise et la croissance des plants.
- Lorsque la nappe d'eau est proche de la surface du sol de façon quasi-constante, ou si le peuplement comprend des Aulnes glutineux, la culture de l'Aulne est conseillée.
- Il est fortement conseillé de traiter avec un produit fongicide les jeunes semis ou plants de Pin sylvestre contre le rouge cryptogamique.

TYPE DE STATION N° 7

Peuplement et végétation

- Peuplement de Pins sylvestres avec présence possible de Chênes sessiles
- Sous-étage éventuel de Hêtres avec Charmes très dispersés
- Présence fréquente de Ronce, surtout dans les trouées
- Présence possible de Molinie, de Myrtille, ou de Canche flexueuse
- Présence possible de Chèvrefeuille, d'Oxalis, de Sceau de Salomon, ou de Lierre
- Présence possible de Luzule blanchâtre ou de Fougère aigle


Localisation et fréquence

- Fréquent et très étendu



« Sol brun ocreux » (Photo : J.L. DUPOUEY)

Coupe schématique du sol



SOL BRUN OCREUX

Caractères essentiels du sol

- Sol sec, même en hiver
- Litière continue, épaisse, composée de feuilles et aiguilles entières et fragmentées, avec de nombreux filaments blancs
- Sol sableux
- Description :
 - Couche éventuelle très noire, peu épaisse, en surface
 - Couche sous-jacente sableuse, de couleur brun clair ou ocre
 - sable blanc ou orangé apparaissant en profondeur

Facteurs limitants

- Faiblesse des réserves en eau du sol
- Richesse chimique du sol faible

Facteurs favorables

- Sol profond

Fertilité

Faible

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Chêne sessile
Chêne rouge
Pin sylvestre
Mélèze d'Europe

Possibles

Douglas
Épicéa
Pin Laricio

A éviter

Chêne pédonculé
Frêne

Précautions et conseils

- Il est souhaitable de traiter avec un produit fongicide les jeunes semis ou plants de Pin sylvestre contre le rouge cryptogamique.

TYPE DE STATION N° 8

Peuplement et végétation

- Peuplement de Pins sylvestres, avec Chênes sessiles et pédonculés
- Sous-étage éventuel de Hêtres avec Charmes parfois bien représentés
- Molinie à fort développement dans les trouées, souvent mélangée au Crin végétal ; présence possible de Myrtille ou de Canche flexueuse
- Présence possible de Chèvrefeuille, d'Oxalis, de Sceau de Salomon ou de Lierre
- Présence possible de Fougère aigle, de Luzule blanchâtre ou de Ronce


Localisation et fréquence

- Très fréquent et très étendu



« Pseudogley podzolique » (Photo : J.L. DUPOUEY)

Coupe schématique du sol



Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Litière continue, épaisse et tassée, composée de feuilles et aiguilles entières et fragmentées
- Sol sableux ou sablo-argileux, de couleur globale beige à grise, avec décoloration en importantes taches blanchâtres
- Présence possible de taches rouille
- Apparition éventuelle d'un plancher argileux en profondeur

Facteurs limitants

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Risque de sécheresse estivale
- Richesse chimique du sol faible

Facteurs favorables

Fertilité

Faible

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Chêne sessile
Pin sylvestre

Possibles

Épicéa

A éviter

Chêne rouge
Douglas
Mélèze d'Europe
Pin Weymouth

Précautions et conseils

- Sur ces stations, un drainage et un labour préalables favorisent la reprise et la croissance des plants.
- L'Épicéa peut présenter des risques sanitaires (Bostryche, chablis).
- Il est fortement conseillé de traiter avec un produit fongicide les jeunes semis ou plants de Pin sylvestre contre le rouge cryptogamique.

TYPE DE STATION N° 9

Peuplement et végétation

- Peuplement de Pins sylvestres avec présence possible de Chênes sessiles
- Sous-étage fréquent de Hêtres ; absence du Charme
- Présence possible de Myrtille, de Molinie, ou de Canche flexueuse
- Présence possible de Fougère aigle
- Absence de Chèvrefeuille, d'Oxalis, de Sceau de Salomon et de Lierre
- Absence de Luzule blanchâtre et de Muguet


Localisation et fréquence

- Fréquent et étendu



« Pineraie avec sous-étage de Hêtres » (Photo : J.L. DUPOUEY)

Coupe schématique du sol



Caractères essentiels du sol

- Sol sec, même en hiver
- Litière très épaisse (de l'ordre de 10 cm) continue, composée de feuilles et aiguilles entières et fragmentées, avec de nombreux filaments blancs
- Description :
 - Couche noire peu épaisse (5 cm environ), en surface
 - Couche chocolat violacé de l'ordre de 5 cm d'épaisseur (difficile à distinguer), sous-jacente
 - Couche sableuse, ocre, bien individualisée
 - Sable sec, blanc ou orangé, apparaissant en profondeur

Facteurs limitants

- Faiblesse des réserves en eau du sol
- Richesse chimique du sol faible

Facteurs favorables

- Sol profond

Fertilité

Faible

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Pin sylvestre
Mélèze d'Europe

Possibles

Chêne rouge
Pin Laricio
Épicéa

A éviter

Chêne pédonculé
Douglas

Précautions et conseils

- Un labour préalable est favorable à la reprise et à la croissance des plants.
- Il est souhaitable de traiter avec un produit fongicide les jeunes semis ou plants de Pin sylvestre contre le rouge cryptogamique.

TYPE DE STATION N° 10

Peuplement et végétation

- Peuplement de Pins sylvestres avec Chênes sessiles et pédonculés
- Sous-étage fréquent de Hêtres ; absence du Charme
- Molinie à fort développement dans les trouées
- Présence possible de Myrtille ou de Canche flexueuse
- Présence possible de Fougère aigle
- Absence de Chèvrefeuille, d'Oxalis, de Lierre, de Sceau de Salomon et de Crin végétal


Localisation et fréquence

- Fréquent et étendu



« Pins sylvestres » (Photo : P. GELDREICH)

Coupe schématique du sol



Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Litière continue, très épaisse (de l'ordre de 10 cm) et tassée, composée de feuilles et aiguilles entières et fragmentées
- Description :
 - Couche noire de l'ordre de 5 cm d'épaisseur, en surface
 - Couche sableuse, de couleur blanchâtre, sous-jacente
 - Apparition éventuelle d'une couche compacte de couleur rouille
 - Apparition éventuelle d'un plancher argileux en profondeur

Facteurs limitants

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Sécheresse estivale
- Richesse chimique du sol faible

Facteurs favorables

Fertilité

Faible

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Pin sylvestre

Possibles

Chêne sessile
Épicéa

A éviter

Douglas
Chêne rouge

Précautions et conseils

- Sur ces stations, un drainage et un labour préalables favorisent la reprise et la croissance des plants.
- Il est fortement conseillé de traiter avec un produit fongicide les jeunes semis ou plants de Pin sylvestre contre le rouge cryptogamique.
- Il est conseillé de supprimer la Molinie par traitement phytocide.
- Proscrire les pare-feux en Chêne rouge d'Amérique.

TYPE DE STATION N° 11

Peuplement et végétation

- Peuplement ouvert de Pins sylvestres et de Chênes pédonculés et sessiles
- Absence de sous-étage ; absence du Charme
- **Molinie en grosses touffes** formant un tapis dense et continu
- Présence fréquente de **Sphaignes**
- Présence possible de **Myrtille** ou de **Canche flexueuse**
- Présence possible de **Fougère aigle**
- Absence de **Chèvrefeuille**, d'**Oxalis**, de **Sceau de Salomon** et de **Lierre**


Localisation et fréquence

- Rare et localisé dans des dépressions



« Peuplement ouvert de Pins sylvestres » (Photo : P. GELDREICH)

Coupe schématique du sol



Caractères essentiels du sol

- Nappe d'eau proche de la surface du sol toute l'année
- Litière épaisse de feuilles de Molinie
- Description :
 - Couche de matière organique noire
 - Couche intermédiaire sableuse, de couleur foncée avec des taches blanchâtres
 - Apparition, en profondeur, d'une couche grise, gorgée d'eau, à odeur d'oeuf pourri, ou d'une couche bariolée de rouille et de gris

Facteurs limitants

- Nappe d'eau proche de la surface du sol en hiver et au printemps
- Richesse chimique du sol faible

Facteurs favorables

Fertilité

Très faible

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Auline glutineux

Possibles

Bouleau pubescent
Pin sylvestre

À éviter

Chêne rouge
Douglas
Épicéa

Précautions et conseils

- Les investissements sont à limiter sur ces stations.
- Le drainage est difficile, voire impossible.
- Pour installer le Pin sylvestre, il est préférable de mener une régénération naturelle ; en cas d'échec et sur de grandes surfaces, recourir au semis artificiel après traitement phytocide de la Molinie et labour.
- Il est indispensable de traiter avec un produit fongicide les jeunes semis de Pin sylvestre contre le rouge cryptogamique.
- Proscrire les pare-feux en Chêne rouge d'Amérique.

TYPE DE STATION N° 12

Peuplement et végétation

- Peuplement ouvert de Pins sylvestres peu vigoureux
- Absence de sous-étage de Hêtres ; présence éparse de Chênes pédonculés rabougris
- Tapis de Canche flexueuse
- Présence fréquente de Callune et de Myrtille


Localisation et fréquence

- Limité à la frange Sud du massif de Haguenau ; relief parfois légèrement ondulé dû à la présence d'anciennes dunes continentales, fixées par la Pinède (Burgbann)



« Pineraie sur dune » (Photo : J.L. DUPOUEY)

Coupe schématique du sol



Caractères essentiels du sol

- Absence de litière
- Couche fine organique noirâtre avec un important feutrage racinaire, surmontant un sable orangé qui devient rapidement rose en profondeur

Facteurs limitants

- Pauvreté chimique du sol
- Sécheresse

Facteurs favorables

Fertilité

Très faible

CHOIX DES ESSENCES

Conseillées

Pin sylvestre

Possibles

Pin Laricio

Robinier











Bouleau verruqueux

A éviter

Précautions et conseils

- Les investissements sont à limiter sur ces stations.
- La régénération naturelle du Pin sylvestre sera recherchée ; il est possible de l'enrichir avec du Pin Laricio planté en godet.
- Le traitement fongicide des semis est inutile.
- Les reliquats de zone à dune doivent être protégés en raison de leur beauté, de leur rareté (relief et sol), et du caractère indigène supposé du Pin sylvestre.


PRINCIPAUX FIGURÉS UTILISÉS DANS LES COUPES SCHEMATIQUES DES SOLS

	Litière
	Couche organique peu active
	Couche organique active
	Calcaire actif (particules fines)
	Argile
	Couche blanchie
	Accumulation de fer (couleur ocre)
	Taches rouille
	Couche gris verdâtre
	Roche-mère sableuse en cours d'altération

CORRESPONDANCE ENTRE LES TYPES DE STATION DU GUIDE ET CEUX DE LA THÈSE DE J.L. DUPOUEY (1983)


NUMÉRO DU TYPE DE STATION	
Guide pour le choix des essences	Thèse de J.L. DUPOUEY
1	Aulnaies mésotrophes à eutrophes
2	1 000
3	2 200
4	2 300
5	2 410
6	2 420 et 2 430
7	3 110 et 3 210
8	3 120 et 3 220
9	3 310
10	3 320
11	3 400
12	Pineraies sur dunes

QUELQUES PLANTES CARACTÉRISTIQUES




Ail des ours : Bärenlauch, Stinklauch
(*Allium ursinum*)

- 15 à 40 cm
- tige avec feuilles ovales à long pétiole partant de la base
- fleurs blanches étoilées
- odeur d'ail
- se développe au printemps, disparaît en été



Bruyère commune : Heidekraut
(*Calluna vulgaris*)

- 30 cm à 1 m
- feuilles courtes (3 mm)
- fleurs roses en clochettes, en grappes terminales





Arum, Gouet tacheté : Zehrwurz
(*Arum maculatum*)

- 20 à 50 cm
- feuilles toutes vertes ou tachées de brun, à long pétiole partant de la base
- fruits rouges en grappes

Canche cespiteuse : Rasenschmiele
(Deschampsia caespitosa)

- 30 cm à 1,50 m
- feuilles coupantes de bas en haut, à nervures saillantes parallèles
- en touffes compactes





Canche flexueuse : Drahtschmiele
(Deschampsia flexuosa)

- 30 cm à 80 cm
- feuilles fines et enroulées
- touffes basses et plus ou moins serrées

Grand Carex : Schlanke Segge, Ufer-Segge
(Carex acutiformis et riparia)


- 50 à 120 cm
- souche gazonnante
- tige robuste, triangulaire
- feuilles longues, larges (5 à 15 mm)





Chêne pédonculé : Stieleiche, Sommereiche
(*Quercus robur*)


- arbre
- feuilles avec 2 lobes à la base, pétiole quasi-absent
- gland avec long pédoncule



1 cm [

Chêne sessile : Steineiche, Wintereiche
(*Quercus sessiliflora*)

- arbre
- feuilles avec pétiole très net
- gland sans pédoncule



1 cm [



1 cm [


Chèvrefeuille des bois : Waldgeissblatt

(*Lonicera periclymenum*)

- arbrisseau de 1 à 3 mètres, grimpant ou rampant
- feuilles ovales sans pétiole, disposées par 2 face à face
- fleurs odorantes, blanches ou rougeâtres


Circée de Paris : Waldkletten
(*Circaea lutetiana*)

- 30 à 60 cm
- feuilles ovales, faiblement dentées, opposées 2 à 2
- petites fleurs blanches



Crin végétal : Seegras
(*Carex brizoides*)

- 20 à 60 cm
- souche rampante
- tige grêle triangulaire
- en touffes, couchées comme une crinière



Fougère aigle : Adlerfarn
(*Pteridium aquilinum*)

- 40 cm à 2 m
- fronde isolée, ample, à long pétiole

Iris faux acore : Sumpf, Schwertlilie
(*Iris pseudacorus*)


- 50 à 120 cm
- fleurs jaunes
- feuilles vertes en forme de glaive



Lierre, Lierre grimpant : Efeu

(*Hedera helix*)

- rampant ou en liane
- feuilles coriaces, luisantes, persistant l'hiver





Lierre terrestre : Erdefeu, Gundermann

(*Glechoma hederacea*)

- plante mollement poilue, rampante
- feuilles rondes, crénelées, molles, avec pétiole
- fleurs violettes groupées par 2 ou 3 à l'aisselle des feuilles


Luzule blanchâtre : Marbel, Hainbinse
(*Luzula albida*)

- 40 à 80 cm
- feuilles allongées, poilues, étroites (3 à 6 mm)
- fleurs groupées au sommet, d'un blanc cendré



Maianthemum : Schattenblume
(*Maianthemum bifolium*)

- 10 à 20 cm
- souche traçante
- tige dressée, simple, anguleuse
- 2 à 3 feuilles sur la tige, en coeur, avec pétiole
- fleurs blanches en grappes au sommet




Molinie : Pfeifengras, Anshan
(*Molinia caerulea*)

- 30 cm à 1,50 m
- feuilles planes avec un anneau de poils à la jonction de la tige
- en touffes compactes


Myrtille : Heidelbeere
(*Vaccinium myrtillus*)

- sous-arbrisseau de 20 à 60 cm
- feuilles petites, ovales, dentées
- baies bleu-noir



Oxalis : Sauerklee
(*Oxalis acetosella*)

- 5 à 8 cm
- souche rampante
- feuilles longuement pétiolées en 3 parties, vert clair
- fleurs blanches solitaires sur des pédoncules aussi longs que les feuilles





Primevère élevée : Hohe Schlüsselblume
(*Primula elatior*)

- 15 à 30 cm
- feuilles en rosette à la base de la tige
- fleurs jaunes

Reine des prés : Wiesenlönigir, Krampfkürüt
(*Filipendula ulmaria*)

- 1 m
- feuilles grandes, divisées en plusieurs parties, dentées, souvent blanchâtres en dessous
- fleurs blanches




Sceau de Salomon : Salomonssiegel, Weisswurz
(*Polygonatum multiflorum*)

- 30 à 60 cm
- tige simple, dressée, cylindrique
- feuilles allongées, à nervures marquées, redressées sur 2 rangs
- fleurs blanches, pendantes par 2 à 6, sur des pédoncules

Sphaigne : (*Sphagnum palustre*)

- mousse souvent gorgée d'eau



Violette des bois : Waldfeiala
(*Viola reichenbachiana*)

- 10 à 30 cm
- feuilles en coeur, crénelées, en rosette à la base et alternées sur la tige
- fleurs violettes

Coordination : Anne MADESCLAIRE (C.R.P.F.)

Conception : Jean BRAUD (C.R.P.F.)
Jean-Luc DUPOUEY (C.R.F./I.N.R.A.)
Xavier GAUQUELIN (O.N.F.)
Pierre GELDREICH (O.N.F.)
Anne MADESCLAIRE (C.R.P.F.)
Philippe THEVENET (C.R.P.F.)

Appui scientifique : Jean-Luc DUPOUEY (C.R.F./I.N.R.A.)

Maquette et illustration : Vincent JAGERSCHMIDT

Dessins botaniques : Dominique MANSION
Extraits de la « Flore forestière française » - I.D.F., D.E.R.F.,
E.N.G.R.E.F. - 1989

Bibliographie : « Étude phytosociologique et écologique du massif forestier de
Haguenau » - DUPOUEY - C.R.F./I.N.R.A., I.N.A.P.G. - 1983

Mars 1990

Financement : Conseil Régional d'Alsace
Ministère de l'Agriculture
Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine-Alsace
Office National des Forêts, Région Alsace

Document disponible au : C.R.P.F. de LORRAINE-ALSACE
2, rue du Travail
67000 STRASBOURG
Tél. 88.32.55.06

**CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE DE LORRAINE-ALSACE**

41, avenue du Général de Gaulle
57050 LE BAN SAINT MARTIN
Tél. 87.31.18.42

**OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
DIRECTION RÉGIONALE ALSACE**

2, rue de l'Hôpital Militaire
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. 88.36.31.58

FORÊT PRIVÉE D'ALSACE

2, rue du Travail
67000 STRASBOURG
Tél. 88.32.55.06

**CENTRE DE RECHERCHES FORESTIÈRES
DE L'INSTITUT NATIONAL DE
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE**

Champenoux
54280 SEICHAMPS
Tél. 83.31.70.80

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT**

**DIRECTION DE L'ESPACE RURAL
ET DE LA FORÊT**

78, rue de Varenne
75700 PARIS
Tél. (1) 49.55.49.55

CONSEIL RÉGIONAL D'ALSACE

35, avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. 88.25.68.67

