

Article Flore

Figures et tableaux




Figure 1 : entretien du sol des modalités Classique et Pied à pied et localisation des relevés floristiques




Figure 2 : critères et sous-critères pris en compte dans le calcul de l'indicateur de pollinisation (d'après Schnell, 2011).



Figure 3 : bourdon (*Bombus* sp.) sur un origan commun (*Origanum vulgare*). © C. Rabolin – INRA Colmar LAE AGISEM



Figure 4 : Ornithogale à feuilles étroites (*Ornithogalum umbellatum*), présente dans les parcelles viticoles. © C. Rabolin – INRA Colmar LAE AGISEM




Figure 5 : richesse spécifique totale recensée dans l'inter-rang enherbé, travaillé et le cavaillon, dans les modalités Classique et Pied à pied, de 2014 à 2016.




Figure 6 : espèces dominantes de l'inter-rang enherbé, dans les modalités classique et pied à pied, classées de la plus faible valeur pollinisatrice à la plus élevée. Les cadres mettent en évidence les espèces dominantes.




Figure 7 : évolution au cours du temps des familles et de la valeur pollinisatrice globale en classique et pied à pied en 2015. Les flèches indiquent les fauches réalisées dans l'inter-rang.




Figure 8 : superposition des fauches réalisées dans les modalités classique et pied à pied en 2015 et 2016, avec les périodes de floraison et valeurs pollinisatrices des espèces dominantes et d'espèces à forte valeur pollinisatrice.