

# La saisonnalité comme vecteur de transition agroécologique ?

Le cas du Fin Gras du Mézenc


David Drevon, Pierre Cornu, Marie-Odile Nozières-Petit

*Forum ODT, 3-4 Octobre 2024, Lausanne, Suisse*




*Geographical Indications  
as Global Knowledge Commons*

# Introduction



- La saisonnalité



Un concept complexe ... (MacDiamird, 2014)


... qui influence la perception des consommateurs sur la viande de bœuf (Ardeshiri et al., 2019)

... et qui est perçue comme une manière de mettre en marché des produits agroécologiques (Loconto et al., 2008)

- L'exemple du Fin Gras du Mézenc (FGM), viande bovine française AOP dont les pratiques d'élevage et de commercialisation sont saisonnées.

→ *Comment le choix de la saisonnalité du FGM s'est-il structuré dans le temps ?*

→ *La saisonnalité favorise-t-elle la transition agroécologique des systèmes d'élevage viande ?*



Les 10 éléments de l'agroécologie (FAO, 2018 ; Barrios et al., 2020)



*Geographical Indications  
as Global Knowledge Commons*

# Le Fin Gras du Mézens



Présentation d'une viande sous AOP




**AOC Fin Gras du Mézenc**  
Aire géographique délimitée



# Brève chronologie de la démarche AOP



**Milieu XXe** Tradition bœuf de Pâques, puis déclin engraissement



## La saisonnalité au cœur du cahier des charges ...

- **Alimentation des animaux**

Pâturage obligatoire du 21 juin au 21 septembre.

Animaux à l'étable au minimum du 30 novembre au 30 mars

- **Animaux conduits en finition : entrée à l'étable avant le 1<sup>er</sup> novembre**

110 jours d'engraissement minimum avec un foin issu des prairies locales

- **Abattage du 1<sup>er</sup> février au 31 mai**

Génisses de 24 mois min – Bœufs de 30 mois min

Génisses 280kg min - Bœufs 320 kg min

## ... et d'autres éléments structurants

- **Diversité raciale**


Salers, Limousine, Charolais, Aubrac. Croisement races à viande x Abondance/Montbéliarde

- **Ressources alimentaires locales**

Foin local et importance de la cistre

## Une production de FGM en forte croissance

Nombre d'animaux commercialisés en FGM



Sources : données issues des rapports de l'association FGM



*Geographical Indications  
as Global Knowledge Commons*

# Méthodologie


# Une méthodologie croisant deux disciplines

## Entrée histoire

- 11 entretiens récit de carrière/récit de vie auprès d'acteurs de la démarche FGM (éleveurs, bouchers, techniciens)
- Dépouillement d'archives
  - Archives départementales de la Haute-Loire*
  - Archives de l'association FGM*
  - Archives personnelles du président de l'association*

## Entrée zootechnie système

- 12 entretiens auprès d'éleveurs engagés en FGM
- Construction de trajectoires d'exploitation (Moulin et al., 2008)



La saisonnalité comme vecteur de la TAE ? Le cas du Fin Gras du Mézenc  
 Octobre 2024 / ODT Lausanne / D. Drevon, P. Cornu, M.-O. Nozières-Petit



*Geographical Indications  
as Global Knowledge Commons*

# Négocier et réinventer une saisonnalité

# La remise en cause de la saisonnalité dans la seconde partie du XXe siècle

- Dans les hautes terres du Massif central : une tradition du bœuf de Pâques.
  - Mézenc : agriculture familiale non-spécialisée avec un peu de lait transformé à destination du marché
  - Des bœufs de travail recherchés qui fournissent aussi de la viande
  - Des animaux âgés, au moins 4-5 ans et jusqu'à 12 ans
- La modernisation agricole a tendu à lisser la production (Pflimlin et al. 2009), au détriment de la saisonnalité
- 1972 : création de la coopérative du Mézenc qui favorise la production de broutards

*« Et surtout, [ la libéralisation du marché ] fait éclater le cercle étroit du marché local traditionnellement limité à la rencontre agriculteur producteur – marchand. Elle réalise une insertion dans le circuit économique global, dont elle fait percevoir les rouages et par rapport auquel elle suscite une adaptation. »*

*AD43, 37T49, J.-C. Petiot, « une région agricole de montagne. Le plateau du Mézenc (Haute-Loire), octobre 1977.*

# Dans les années 1990, des tergiversations autour de la saisonnalité

- Années 1990 : la saisonnalité ne va pas de soi. Projet que le FGM soit le produit phare parmi d'autres productions bovines locales

Création d'une seconde marque pour une viande non-saisonnée, le *Bœuf Terroir du Mézenc*.

- En 1997, l'ISARA fournit une expertise qui va à l'encontre du caractère saisonnier du FGM

« C'est également la **régularité d'approvisionnement qu'il faut viser**. En effet, la démarcation, quel que soit le signe distinctif, permet au consommateur de repérer un bon produit dans son point de vente habituel. Il doit être présent en permanence pour être efficace. **Trop souvent les problèmes de saisonnalité de la production sont des freins au développement des démarches de qualité.** »

Marie Fauvet, « Pour une stratégie d'identification du FGM, Rapport final, ISARA, mars 1997 »

➔ La saisonnalité : choix fort des éleveurs de construire leur démarche autour d'une contrainte



*Geographical Indications  
as Global Knowledge Commons*

# La saisonnalité des pratiques d'élevage : des choix et des tensions

- Des pratiques d'alimentation basées sur des ressources locales : le foin et la pâture  
Intérêt de la cistre dans le foin → une réflexion sur l'entretien des prairies



Une prairie dans la zone Fin Gras du Mézenc au printemps

Sources : <https://projets.cbnmc.fr/prairies/actions/diagnostic-diversite-floristique/aop-fin-gras-mezenc>

« La production de génisses de boucherie permet de valoriser les surfaces en herbe tout en **respectant bien les cycles fauche-pâture des surfaces fourragères**. A leur manière, elles participent pleinement à l'entretien de l'espace herbager et à la protection de l'environnement. »

Chambre d'agriculture de Haute-Loire, « Caractérisation des systèmes de production bovins herbagers extensifs sur le Massif du Mézenc, janvier 1999.

- Des tensions
  - Pression foncière sur les prairies de fauche (accentuée par la PAC ?)
  - Des périodes de fauche de plus en plus incertaines
  - Un appauvrissement de la diversité floristique du foin ?

Périodes de vêlage  
Périodes de vêlage  
Dates de rentrée à l'étable  
Dates de rentrée à l'étable  
Âge des animaux  
Age des animaux  
Poids des animaux  
Poids des animaux

Des leviers d'adaptation pour les éleveurs  
Des leviers d'adaptation pour les éleveurs

- Diversité d'utilisation de ces leviers en fonction des systèmes d'élevage (laitier, mixte, allaitant). Prise en compte de cette diversité :
- Diversité d'utilisation de ces leviers en fonction des systèmes d'élevage (laitier, mixte, allaitant). Prise en compte de cette diversité :
  - 1996 : minimum 135 jours ; génisses 28 mois min et bœufs 36 mois min ; abattage à partir du jeudi avant dimanche de Pâques
  - 2003 : engraissement 110 jours min ; génisses 24 mois min et bœufs 30 mois min ; abattage du 1<sup>er</sup> février au 31 mai
- Tension avec le marché ; recherche d'équilibre entre coûts de production et niveau de valorisation des animaux.
- Tension avec le marché ; recherche d'équilibre entre coûts de production et niveau de valorisation des animaux.

« Maintenant, c'est l'inverse. **Les vêlages, on cherchait à les avoir à l'automne.** Parce que même pour faire du Fin Gras d'abord, on peut engraisser les génisses à deux ans. Nous, ça commence fin août, début septembre, les vêlages. Et une femelle, deux ans après, elle a deux ans avant septembre, elle est vendue finalement à 30 mois, bon poids. **Tandis qu'après quand ça naît l'hiver, en mars, en avril, il faut les garder un hiver de plus ... »**

Entretien avec un éleveur de Fin Gras du Mézenc, mars 2024

# La commercialisation saisonnée du FGM

*Vers des systèmes d'élevage insérés  
dans leur socioécosystème ?*

# L'édification de l'artisan boucher comme figure pivot dans la démarche FGM

- Les bouchers reconnaissent la qualité spécifique de la viande FGM.  
Une connaissance du produit et un discours construit sur la saisonnalité du FGM.

« Pour ce qui était par exemple du bovin, [...] **on était attaché à la production de montagne**. On achetait bien sûr chez nos clients s'ils avaient une génisse, [...], mais on a toujours fait du bœuf de montagne et **notamment avec un point d'orgue à Pâques, parce que la tradition était fortement marquée, ici, avec le bœuf de Pâques.** »

« Si par exemple l'animal venait d'en-haut, **on descendait le foin parce qu'il ne mangeait pas le foin d'ici** ... Alors on amenait une ou deux journées de foin. Les animaux ne mangeaient pas ils n'étaient pas habitués à ce foin. Vice versa si **vous prenez une bête ici vous la montez en montagne elle va manger tout de suite.** »

Entretien avec un boucher d'Yssingeaux, février 2024

- La majorité des bouchers achètent leurs animaux directement auprès des éleveurs.  
Des relations de confiance entre les bouchers et les éleveurs.  
Des éleveurs fournissent les mêmes bouchers depuis des décennies.

# Une persistance des foires grâce au FGM ?

- Le Mézenc : une zone ancienne de foires et de marchés aux bestiaux  
Aux Estables : foire grasse pour Pâques ; foire du printemps le 27 avril ; foire des semences et moutons le 24 juin ; 21 août foire aux bœufs
- Des foires grasses toujours actives aux Estables et au Béage  
→ *Surtout des expositions et des concours : les animaux sont vendus avant la foire*
- Fête du Fin Gras depuis 1997



La foire aux Estables : aux alentours de 1900 (à gauche) et en 2023 (à droite)

Sources :

<https://www.reussir.fr/agriculture-massif-central/la-foire-grasse-un-temps-de-convivialite-autour-dun-concours-bovins>


<https://www.leprogres.fr/techniques/2020/05/12/les-estables-grimpez-dans-la-machine-a-remonter-le-temps>



*Geographical Indications  
as Global Knowledge Commons*

# Conclusion

- Dans le cas du Fin Gras du Mézenc, la saisonnalité apparaît comme un levier pour favoriser la transition agroécologique des élevages.



Proposition d'un visuel narratif (Barrios et al., 2020) centré sur la saisonnalité illustrant la trajectoire agroécologique du Fin Gras du Mézenc

- **La saisonnalité du Fin Gras du Mézenc : une réinvention et une actualisation de pratiques anciennes**
- **Par sa saisonnalité, le Fin Gras du Mézenc s'affirme comme un produit de qualité de niche tout un produisant une norme locale**  
Les animaux FGM servent de mesure étalon pour les animaux locaux, « *c'est comme le FGM* »
- **En période de crise, une saisonnalité remise en cause**  
Printemps 1996, Vache Folle engendre un décalage des ventes  
2020, COVID-19 conduit à une révision temporaire du cahier des charges
- **L'intérêt d'une approche interdisciplinaire pour analyser la saisonnalité**  
Une approche système pour comprendre l'intégralité du système sociotechnique  
Une approche diachronique pour comprendre comment la saisonnalité se construit et comment elle résiste dans le temps

# ***Merci de votre attention***

## **Contact :**

David Drevon, INRAE

*Doctorant en histoire et zootechnie système*

UMR Selmet – UMR Territoires

*Mail : [david.drevon@inrae.fr](mailto:david.drevon@inrae.fr)*